

Therapie

A - G

PRESENTED BY
INTERDEPARTMENTAL
COMMITTEE

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE
Bethesda, Maryland



Anämie, sekundär; Anämie d. letzten
 Generation: Tonus fission; Fe, immer für
 wandlung: 2 wöchig. (3-5,0 pr. die) z. S.
 Ferrum redüctum 3 x hzgl. 1,0. Ferrosta-
 eil 3 x 2 Tabl. Auf vollen Morgen. Auf
 präp. ^{Fill. asiatic 1 hzgl. Thigum eit G.} für Aufhebung d. Fe Wirkung.
 Sattmüde, Gähnenklänge.

Angina: Katarrhalisch ^{z. Wellen}; Sattmüde, fieberhaft
 wirtel zw. 4. & 5. Bronchien, Fingern mit H₂O₂
 od. fip. Ramiellenn. wobl. Dylücken o.
 4. & 5. Bronchien. Tonsillarabszess: Dabgl., ab-
 flüßl. Nigulung. Bei Perforation Öffnung
 parallel d. Zungenwurzel, 1-2 cm tief, auf d. mit-
 helfst. zw. Luft. Kavalen u. Sepsis d. Linsen
 la, mit Zungenwurzel wohnen mit H₂O₂ od.
 Ramiellenn. | pülenn. Claut-Vincent: 1 x
 Salvarsan i.v., Pimpeln mit 5% Jodform.

Angina pectoris: Zu Auffall: 1% Alkohol. Li-
 troglycerinölöfl. 10-15 Tropfen; Litholingualbe-
 reitung u. a. Auffallsprinzip: anti spasmus
 Diff. Piminkörper: Theobrominherbl. (Kugel)
 3 x hzgl. 0,15; Diänetinherbl. 5 x hzgl. 0,5; Teo-
 minal (Theobrom. 0,3 + diänetin 0,03). Diänetin
 in d. Fingergewebe, d. fip. d. kavalen

Asthma cardiale: Strophanthin i.v. 0,25
Atrioventr., Turtwickel, evtl. Digitalis
ex (Salycin 1 cm i.m.)

Astenosklerose: Urämie oder d. Klüden
aufgrund des Faltes. Von Zeit zu
Zeit eitrige Rötungen, evtl. Drogen-
mittel (Dorn, Aspirin, Adalin) ist erk-
krankungsbedingte; Alkohol, Fenchel, Yucca, Gu-
wurzeln im Pflanzenbau, Kirschen Pflanz, Zi-
gerne u. w. Regulierung d. Darmtätig-
keit. Leiden gegenüber. Leiden.
Leiden mit Mundtod: jod. 2. Monat hgl.
eis zu 5 x 0,1 JK, im Pflanzenbau mit klein-
em Dorn. Auf Leiden ~ angina pectoris.

Asthma bronchiale: im Anfall: Adrenalin
1%o 1/2-1 cm s.c., Asthmalysin (Adren. + Hypo-
physin), Ephedrin od. Ephetonin 0,05 s.c.
od. 0,05 als Tablette, Sympatel-Tabl. s.o., 1g.
Affenzigeantenn (Alkaloide + Kiste)
Atropinbör: wofür. 2 x hgl. 1/2 mg. ^(NLM) i.m.
Darm: Calcium per os od. Apenilinjektion.
Körnung für 2,5: 150 3 x hgl. 1 ypl. Aufstieg
Jodimpfindlichkeit! flücht. flücht. flücht.,

Reinigt. Kommen. Rö auf der Seite.
Ausbildung in der T für die
Ortsverwaltung

B

C

D

E

F

G

G

Faint, illegible handwriting, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 20 horizontal lines across the page.

B

C

D

E

F

G

G



B

C


D

E

F

G

G



B

C

D

E

F

G

G



Laryngitis, akut: Salknise, Dufurkane, Jap. -
nit, Sulfurwikel (0,5 kg. Sulfurwikel auf 1 l
Wasser unter 70°, dann auf ein feuchthaltiges
Tuch. Einige Minuten lang einlegen, mit
Öl einreiben.) Inhalation. Aufweitung d.
Luftröhre. Yspulveranwendung. Joaniff: allgemein, i. v.
ultra. Lichttherapie, bei peripherer Tuberkulose Sulfur-
lanica. Inhalation (Eukalyptus). Thermo-
treatment d. Flüssigkeitstherapie (Sjost, NaCl am)
Regulierung d. Darmtätigkeit, Zerkleinern d.
Jugend. Klimat. Räume (SW Dümpfdruck,
Wärme, Röhre.)

Botulismus: Magnesiumpulver, Timkoffen,
(Spe. weiß in Wasser) Rizinus, NaCl-Zusatz.
Stychnin nitric. s.c. 1-5 mg hyl., präpariert
Pflanzensamen 50-100 cc. i. u. od. 50 i. v. od. 20
40 intr. lumbal.

Bronchialitis acuta = capillärbronchitis
bei Kindern häufig. Amislerif: Sulfurpulver-
gen, Lärin Sulfur. Löflin Sulfur: radix
Specacanthae (0,4:180) od. radix senegae
(5,0:180) [Lungm. hyl. 1 ypl.] am besten mit
Liqu. ammoniacalis 3-4 x hyl. 5-10 Tr. in
Jahrespflanz zur Anregung d. Jugaktion.

Bronchitis chronica: herbium: JK 5,0:150 ypl. nit, Specas. i. o.
yupur Sulfurpulver, frucht: Balsamica infalium od. per os als kug-
belkapfen nupm. hyl. 0,25

B

C

D

E

F

G

G

Smilaxgummizubereitung wie mit S. Thillgalt:

Rp. argent. nitr. 0,1 ; Balsam. peruv. 1,0 ; va-
rel. alb. ad 10,0. Smilaxgarden 5-10' vor
S. Oculum Anästhesiefallen. Die vor S. Thillum
abgeworfen wird der Saugfähigkeit.

C

D

E

F

G

H

[Faint, illegible handwriting visible through the paper]

C

D

E

F

G

G



C


D

E

F

G

H



Capillärbronchitis: f. Bronchialitis acuta

Acute minor: kindeswohl, einm. Säugling 0,1
Blutk. 0,2, ^{II} ~~Blutk.~~ 0,3 14 Tg. lang abmids.
anfängl. alle 2 Tg. Schluckkontrolle, dann tägl.
wegen agranulocytosegefahr. Cdr. Arphen: Rp.
liq. cal. arsenic. 10,0; aq. menthali 20,0; für
I 3.3-3.6; II 3.6-3.12-3.18 III 3.12-3.24. Thunfisch
körperlige und pulvif. Röhren über 2 Wochen, wenig
und Monate.

C

D

E

F

G

H

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

0

1

2

3

4




D

E

F

G

G



[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

e


o

f

f

g

g



Decubitus: allgummin, Süßholzwurzel/pinkette, Sassafras-
pflanzl.; fäulst; Granulationsanregend: Sassafras-
pflanzl.; tingüent. Balsam. pers. 1:30.; Pflanzl. d. Sassafras.

Diarrhoe: Einwirkung auf D. kramm: Atropin

Rp. extr. Belladonnae 0,02 M. f. suppos. D. kramm
Papaverini hydrochl. 0,03 doses kr. VI, S. emi
olei cacao 2,0 Süßholzwurzel

Morphin; Jurebrind. f. kramm. Kräfte: mucilla-
ginosa p. Talcum; Jurebrind. D. Pflanzl.
kräftig Adstringentien.

Diphtherie - Stimm - heute - heute: kramm di:

2 - 4000 E, Kräfte 5 - 8000 E, Ruffkopf 10 -
15000 E, Kräfte 20 - 30000 E.

D

E

F

G


G

E

F

G

G




[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

F

T

S

G



Ypilupia: Lotion, ent. KBr, 2,0g pro die
auf 6,0, longform. Soni fruchtbar. Fällung 15,0.
NaCl kein Kopf; Präparat nach ungenau
2,0-3,0 pr. die. Lotion nur 2-3x tägl. 0,1
- 0,15, Präparat 3x 0,05.

Yolumen: Soni mittel: Apomorphin (ho-
riest) Rp. Apomorphin, per os CuSO₄.

Jugum: Lotion, Endothel. Versuch
Rp. Apomorphini hydrochlor. 0,05 g dest. ad 10,0
M.D. verla 5, 1-2 cm zu injizieren.

Eryipell: Granulosil

lokal indiff. Salben, absoj. kuppeligen,
Zurückkehr, Sinopfe Thrombose

Endocandilis simplex: I. Myocandilis
acuta.

Ekzem (Bläschen, ~~rot~~ wässrig, Krüppel): Lotion
mit Salicylöl + Rizinus (10:90) abso-
jieren, dann 10%ige Yffigf. kuppeligen: Rp. Lig
alumin. subacet. 10,0; Anaesthesin 15,0; va-
sel. par. + Lanolin ad 100,0. Finnen/Finnen,
(Mastknotenband, 3 Tage lang tägl. nach Abfu-
erung d. Juckdg. Jucken d. Juck mit Thierkollum
kur: Rp. naphthalan 2,0-5,0 (alle 2-3 Tage mi-
gen auf 10,0; 20,0, 30,0 aber nur, wenn keine
Bläschen da sind); Unguent. dest. ad 100,0; An-


E
F
G
G

aesthesia 10,0. ^{Touren} Prüfung zur Käppfornung
Vor J. 1. Thierkohlensäureanalyse. mit pil-
zen oder Jinkpfeife einwirken. Zwei tüchtige
pro Substanz je 0,1 L. minimal. " mit Tu-
kult vor 3% Prinzip. Keller (J. Zupetigo).

17

5

6




9

F

9


G



7

5


5



[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

5

5



Gelenkerkrankungen mit: Salicylatum:

Soni Bistum 1/2-1/3
weindform Salicyl als Zupf alt.

hydr. salicyl. od. Aspirin (Acetylsalicyl.) per os
4-8,0, höchst. 10,0 pr. die für Fieber, Rheu-

ma u. Migrän: Kapseln 1,0 abt. 2,0-3,0
od. Tabletten 4,0-8,0 ^{in 60g 200/100} hgl. auf 2 Dosen ent-

gegen Krämpfe: NaHCO_3 3,0-5,0 hgl.

zu d. polyart. Rheu. Salic. Dosen f. analgetikum
auf 2-3 x hgl. 0,1. Krämpfe d. Gyna-

midien 5-10 x hgl. 0,3. od. auf Salicyl:

Hydrotherap. Soni Bistum: Hydrotherap.
Diaphor. u. w. Tröpfelgl.: Fieber-

ung d. „oral sepsis“ u. a. Fieberfieber.

* bei Fieber, d. auf Salicyl nicht anspricht.

Grundf. ind. Antikammit u. inige Te-

ge in hoher Dosis, kurze Zeit in kleiner

Dosis absetzen. Ant. Ant. Ant. Ant.

Gonokokkenarthritis: im akt. u. akt. u. akt.
Fieber, Analgetika (Fenolide u. a.), ungenügend

G

G

D. pfungf. Had. paffion Samungungun, Stänna
Sinnff Thätung d. hin. auf Hd. püigun.
allgummin : 60 - vaccine, Primierpud uff woy
Abklingun d. Yuffünd. am Juleuk. Abophang
i. v. oft pfungfinturnd.

gonococcensepsis : Trypaflavin, Fülmar
gin (Sillenprip.) i. v.

22
The first part of the paper discusses the
importance of the study and the
methodology used. The second part
presents the results of the study and
the conclusions drawn from them.
The paper is divided into several
sections: Introduction, Methodology,
Results, and Conclusions.

Gastritis, akuta: 1-2 Tage Nahrung, langf.
Überleiten zu gewöhnl. Kost. Acid. hydrochlor.
dilut. 3 x hyl. 20-30 gtt. wärfmud D. 7-ffmud
Emetica: 3. d. Apomorphin. hydrochlor. 0,1
aqua dest. ad 10,0; 1/2-1 cem subcut.; im An-
flup Abfufmittel. chronica: Reisfettg. D.
wärfmud. D. 7-ffmud; Diät: anbohen alles Fett
u. Fettgubankuma (außer Tafel, Butter) Reis
(außer Quark) Kaffee, Jule ad. piffus druck,
Jule. Jule, Jule u. Kaffee. Alle Spei-
sen zu kochen, viele kleine Mahlzeiten.
Reis. Acid. hydrochl. dilut. 1.0.; Todemann D.

Grippe: In den ersten Tagen nach Fieber
erregung; Aspirin, Fufalinon ufw. Viel trinken,
Ernährung mindern 1 l. Trifftig offen
u. d. 3. d. Coffein. natr. Benzoi. 2-3 pde. 1 cem s. c.
Strophantin 0,50-0,75 i. v. natr. täglich. Sonst Quinine
u. d. 3. d. Chininacetat 0,5 i. m. Jung. venal
giffen auf Grund in D. Rückenschmerz zug: Chinin
arseniat; Rp. Chinin. hydrochlor. 5,0; acid. arse-
nicos. 0,2 liass. pil. q. s. ut f. pil. lw. 100 3 x hyl 1 pil.
oder Compositum ~~MBK~~ (MBK) Ferrum cum
acid. arsenicos. compos. 2-3 x hyl. 1-3 Mals.
Eliminat. kaffee.

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

