

類聚方集覽

全



誤字考正

賜谷先生著

類聚方集覽

金

生績堂藏

類聚方集覽標註序  
東洞子所著之方極類聚方  
書及醫方分量皆醫家大寶  
也故今集之令可一覽以  
便日用又粗有所得者註之其標以

示<sub>ス</sub>子弟也然<sub>レ</sub>方極<sub>レ</sub>之文固<sub>ク</sub>貴<sub>ク</sub>簡<sub>ク</sub>  
故<sub>ニ</sub>世人<sub>ニ</sub>遽<sub>ニ</sub>見<sub>テ</sub>或<sub>レ</sub>以<sub>テ</sub>爲<sub>ス</sub>不<sub>レ</sub>詳<sub>ク</sub>今<sub>レ</sub>往<sub>ニ</sub>  
注<sub>ニ</sub>補<sub>ニ</sub>註<sub>ス</sub>其<sub>レ</sub>主<sub>ニ</sub>症<sub>者</sub>所以<sub>レ</sub>以<sub>テ</sub>爲<sub>ス</sub>禪<sub>ニ</sub>其<sub>レ</sub>  
術<sub>也</sub>若<sub>キ</sub>夫<sub>レ</sub>類<sub>ニ</sub>聚<sub>方</sub>者殊<sub>ニ</sub>貴<sub>ク</sub>精<sub>ク</sub>嚴<sub>ク</sub>  
故<sub>ニ</sub>域<sub>而</sub>刪<sub>之</sub>至<sub>レ</sub>或<sub>レ</sub>有<sub>テ</sub>方<sub>無</sub>症<sub>者</sub>

多矣蒙士必有疑焉抑古人言  
稱六經動及陰陽其志蓋始於  
取譬則區別其症之目已吉子  
不取者惡其辭也惡辭者爲  
蒙士固執以生惑之故已雖然刪

之如斯則有方而無症者不女  
世豈得莫有疑者哉今此舉也  
舊所刪而再收之亦不尠者所  
以欲明其術也要之舊刪與再  
收兩存之則子弟之業思過半

矣故舊本矩而域之者不敢削  
之有再收者圈其傍以別之皆  
標揭其說以審事情其他亦附  
出皆平生所施之治驗與張氏  
遺書其義相得之說而冀有小

補其術者已暫言其凡例以為  
之序爾

享祀三癸亥五月

上總 雜間煥 子昂撰





類聚方集覽目錄

桂枝湯卷三

桂枝加枳湯五

桂枝加芍藥湯二

桂枝去芍藥湯五

桂枝加葛根湯六

栝蒌桂枝湯六

桂枝加黃耆湯七

桂枝加芍藥大黃湯七

桂枝加厚朴杏仁湯八

烏頭桂枝湯七

桂枝加附子湯八

桂枝芍藥加附子湯九

桂枝附子湯一

桂枝附子芍藥加朮湯二

桂枝芍藥加苓朮湯一

桂枝芍藥黃辛附湯二

桂枝芍藥加皂莢湯二

桂枝加龍骨牡蠣湯三

桂枝芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯三

桂枝加芍藥生薑人參湯四

桂枝芍藥黃四湯四

桂枝二越婢湯五

桂枝麻黃各半湯五

小建中湯六

黃耆建中湯七

黃耆桂枝芍物湯七

黃耆桂枝苦酒湯八

桂枝甘艸湯八

半夏散八

桂枝甘艸附子湯九

桂枝甘艸龍骨牡蠣湯九

桂枝人參湯九

人參湯十

茯苓甘草湯十

茯苓杏仁甘草湯十一

茯苓戎鹽湯十一

葵子茯苓散十一

苓姜朮湯十二

苓桂朮甘湯十二

苓桂甘棗湯十四

苓桂五味甘艸湯

苓甘五味杏辛湯

苓甘杏味辛夏湯

苓甘姜味辛夏仁湯

苓甘姜味辛夏仁黃湯

茯苓澤瀉湯

澤瀉湯

五苓散

茵陳五苓散

猪苓湯

猪苓散

牡蠣澤瀉散

八味丸

括婁瞿麥丸

麻黃湯

麻黃加朮湯

麻黃甘草湯

麻黃附子甘艸湯

麻黃附子細辛湯

麻黃杏仁甘艸石膏湯

麻黃杏仁薏苡甘艸湯

牡蠣湯

麻黃淳酒湯卅

坐夏麻黃丸卅

六

小青龍湯卅

大青龍湯卅

文蛤湯卅

越婢湯卅

越婢加朮湯卅

越婢加半夏湯卅

葛根湯卅

葛根加半夏湯卅

葛根黃連黃芩湯卅

小薤胡湯卅

薤胡加芒消湯卅

薤胡去半身加栝蒌湯卅

薤胡加桂枝湯卅

薤胡加龍骨牡蠣湯卅

大薤胡湯卅

白虎湯卅

白朮加人參湯卅

白虎加桂枝湯二五

小承氣湯一十

厚朴三物湯廿六

厚朴七物湯三

大承氣湯卅

大黃黃連瀉心湯八

瀉心湯卅五

附子瀉心湯九

大黃附子湯卅四

大黃甘遂湯卅

抵當湯卅四

抵當丸卅四

橘皮大黃朴硝湯二

大黃硝石湯卅

大黃牡丹皮湯三

大黃甘艸湯三

調胃承氣湯四

桃枝承氣湯五

下瘀血湯六

五瓜根散六

甘艸湯七

桔梗湯七

排膿湯

七十

甘遂半夏湯

八十

甘麥大棗湯

九十

生薑甘枲湯

九十

四逆湯

九十

四逆加入葶藶湯

九十

通脈四逆加豬膽汁湯

九十

附子搜米湯

五十

薏苡附子敗漿散

九十

白通加豬胆汁湯

六十

烏頭湯

九十

芍藥甘草湯

八十

芍藥甘草附子湯

九十

甘草粉蜜湯

九十

甘草乾薑湯

九十

通脈四逆湯

九十

茯苓四逆湯

九十

乾姜附子散

九十

薏苡附子散

五十

白通湯

九十

大烏頭煎

三十

赤丸

九十

真武湯八冊

天雄散三冊

梔子甘草豉湯一冊

枳實梔子豉湯一冊

茵陳蒿湯三冊

梔子厚朴湯三冊

大陷胸湯四冊

小陷胸湯六冊

栝蒌薤白半夏湯七冊

文蛤湯八冊

小半夏湯九冊

附子湯九冊

梔子豉湯四冊

梔子生薑豉湯四冊

梔子大黃豉湯二冊

梔子蘘皮湯三冊

梔子干姜湯三冊

大陷胸丸五冊

栝蒌薤白白酒湯五冊

瓜蒂散七冊

大半夏湯八冊

生薑半夏湯九冊

小半夏加茯苓湯四

半夏苦酒湯四

半夏厚朴湯四

半夏乾姜散四

干姜人參半夏丸四

半夏瀉心湯四

甘州瀉心湯四

生薑瀉心湯四

吳茱萸湯四

厚朴生姜半夏甘草人參湯四

黃連湯四

干姜黃連黃芩人參湯四

大建中湯四

黃連阿膠湯四

黃芩湯四

黃芩加半夏生薑湯四

六物黃芩湯六

六物黃芩湯四

白頭翁湯四

白頭翁加甘州阿膠湯四



木防已湯

八  
其  
六

煎風掣痛

六

木防已去石膏加茯苓芩

消湯

八  
七

防已茯苓湯

九  
四

防已黃耆湯

五

枳實芍藥散

十

枳朮湯

五

排膿散

五

桂枝枳實生姜湯

五

枳實薤白桂枝湯

一

橘皮枳實生姜湯

五

茯苓飲

五

橘皮竹茹湯

三

橘皮湯

三

桂枝茯苓丸

三

芍歸膠艾湯

四

旋覆花代赭石湯

五

赤石脂禹餘糧湯

五

桃花湯

五

大猪胆汁方

六

蜜煎導方

五

酸棗仁湯

七十五

葶藶大棗瀉肺湯

七十五

麻子仁丸

八十五

已椒藶黃丸

八十五

蜀漆散

八十五

十棗湯

九十五

桔梗白散

九十五

走馬湯

十十五

備急圓

上六

礬石湯

一十五

消礬散

六十五

礬石丸

六十五

蛇床子散

六

封林淋實主姜散

五十五

既試方丸

五

附承散

五

竹葉石膏湯

六

麥門冬湯

六

炙甘草湯

六

烏梅丸

六

桂枝芍藥知母湯

六

頭風摩散

六

栢葉湯

六十

當歸芍藥散

六十

黃玉湯

六十

當歸芍藥

六十一

醉葉

六十二

黃土

六十三

五葶湯

虛勞骨蒸方解五葶熟

麻黃湯方

夜令人參寸中

竹葉葛根地黃

知母黃芩石膏

梗木

右十味

此五胡散治骨蒸

熱喘咳甚者

上味子地骨皮去殼

以胡青蒿甘草

知母烏梅

右八味

既試方和末之蜜丸餅子大以棗膏味為服三

射干麻黃湯方用補灸

射干三分麻黃生薑

各四分

細辛紫苑欬冬花

各五分五味子六分大棗一分半夏六分

右九味以水一斗二升先煮麻黃兩沸去上

沫內諸藥煮取三升分溫三服寒熱去載以

欬而上氣喉中水雞聲小麥一趁正和子

厚朴麻黃湯方

正重

石膏五分杏仁半夏杏

鐵砂湯

長冬桂支寸許

白朮五分 鐵粉

牡蠣

右七味 治虛悸短

氣眩暈虛煩并甚

脾方

治急驚風搐惕者

魚且一分 辰砂之

右二味生薑汁和

用之

折衝飲

當歸 川芎 芍藥 牡丹 白朮 白芍 白朮 牛膝 當歸 桂枝

厚朴三分 麻黃二分 石膏五分 杏仁半 夏各

四分 干姜細辛各一分 小麥一錢 五味子四分

右九味以水一斗二升先煮小麥熟去滓內

諸藥煮取三升溫服一升日三服 兩散去土

效而脈浮者六分大棗一分半夏六分

皂莢九二分 椒黃生薑各一分 麻辛紫葳煨冬升

根皂莢八兩刮去皮用酥炙

右一味末之蜜丸梧子大以棗膏和湯服三

丸

丸

丸

丸

丸

千金子將湯 治產後惡露不盡若腰痛不大便者

大黃 當飯 卅 生湯

牡丹 芍藥 吳茱萸 人參

右八味

○治腰痛有奇驗

如婦人或兼患則

左打撲之人亦同

折傷方

牡丹芍藥 仁枳

芍藥

沈降豁胸湯 治水腫肺

氣衝心或支飲

沈香 香附 白中 皂砂  
蒼桑 犀角 桑白 吳茱

九日三夜一服

效而止氣時時吐濁唾但坐不得眠

桂枝芍藥知母湯

桂枝知母防風

各四分

芍藥三分甘草麻黃各

二分生薑蒼朮

各五分

附子

一分五厘

右九味以水七升煮取二升溫服七合日三

當服

諸支節疼痛身體尫羸脚腫如脫頭眩短氣

既試方

七味降氣湯

以子桑白手夏夜冬

青皮白且香附或加木

通生薑

晚花並

桂艾車前堂飯川芎

午藤紅花

子並服

喉癰湯治疔毒咽喉

者

甘州桂枝乾薑且射干

山豆出於

小解毒湯

以夜通中及冬冬溫石

以得在令將阿膠

清毒重寶湯

奇此育牡丹苑子瓜粉細辛倍用

溫溫欲吐  
當歸四通湯

當歸桂枝芍藥細辛各四  
大棗一錢甘州三

通艸三

右七味以水八升煮取三升去滓溫一升日

三服

手足厥寒脉細欲絕者當歸四通湯主之若

其人肉有久寒者宜當歸四通加吳茱萸生



千散飛揚湯

中風

此湯治中風不識人

酸水入人參桂枝芍藥  
炙甘草竹生薑

當飲 主治婦人產後

上逆胸下利 船居婦

者或血目眩

婦人血道

當飯 芍藥 牡丹皮

澤厚 茯苓 薑

桂枝 干姜 甘草

辰砂

清淨子湯 主治水腫

上病 淋病 膿血痛

忌口多小便不利者

防己 白朮 琥珀 浮

附子 瞿麥 天山 甘草

姜湯主之

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

於前方內加吳茱萸六分生薑一錢

竹葉石膏湯 治粘燥氣逆或欲吐者

竹葉四分石膏一錢 半夏四分人參二分 甘草

麥冬七分麥門冬八分 杏仁二分 甘草一分

麥冬七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮

米熟湯成去米溫服一升日三服

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者

麥門冬湯 以水一斗煮取六升去滓內酥卷蒸

麥門冬

二錢七分

半夏四分 人參二分 甘艸

一分五厘

粳米四升 大棗二升 半夏四分 人參

二分 甘艸

右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升

日三夜一服 其藥黃六分 土姜一匙

當大逆上氣咽喉不利止逆下氣者

炙甘艸湯

○行動如常而其

脈結代心中動悸如有驚惕者非此方不能治之

甘州二分 鱉生薑二分 人參一分 地黃一分

黃桂枝二分 阿膠一分 麥門冬七分 麻仁四分

大棗五分

右丸味以清酒七升水八升先煮八味取三升去滓肉膠烱消盡溫服升升廿三服名

復脈湯

姜一分 艾二錢

治傷寒脈結代心動悸者○治虛勞不足汗出而悶脈結悸行動如常○治肺痿涎唾多

既試方

心中溫濕液液者此汗噎噎常○或服養血煎

栢葉湯寒祇該升心陣射者○或煎藥不與代

栢葉干姜

各六分

艾二錢

右三味以水五升取馬通汁一升合煮取一

升分溫再服此升水八升煮八和取二

治吐血不止者上

黃玉湯

二公同

正

風

麥門冬

升

公

麻黃

四

分

煎

中

甘州乾地黄末附子阿膠黃芩

各四分

煎

中

煎

中藏集

○此心野辯難辨

○反胃之症世醫難其治此方速治之實奇劑也

黃連

錢二

芒藥

各四

當石七味以水八升煮取三升温服

芥血先便後血此遠血也起使細脈者

烏梅丸

十八人 細辛附子桂枝人參黃柏

烏梅九十 細辛附子 桂枝人參 黃柏各十

姜錢二 黃連三

當歸川椒各八

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿

去核蒸之五升米下飯熟搗成泥和藥令相

得內日中與蜜杵二千下丸梧子大先食飲

服十九丸日三服稍加至三十丸禁生冷滑物

臭食等

黃連

二錢

當歸

川椒

各八

虻厥者當吐虻令病者靜而復時煩此為厥

寒虻上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩

者虻聞食臭出其於鼻自吐虻虻厥者

當歸芍藥散

水八

升

蒸

取

三升

服

當歸芍藥

各三

芍藥

一斤

茯苓

木

各四

澤瀉

○治小便微難腹中痛者

○又胃之益世醫

之費者

○又胃之益世醫

半斤

右六味并為散取方寸匕酒和日三服合藥  
婦人懷妊腹中疝痛

大黃蠶蟲丸

大黃十分 黃芩二兩 甘艸三兩 桃仁一升 杏  
仁一升 芍藥四兩 乾漆炙二兩 乾地黄切二兩 蠶蟲  
五升 水蛭百枚 蟻蠟炙一升 麤虫半斤長者  
右十二味末之煉蜜和丸小豆大酒飲服五

九日三服末之麩蜜味甘小豆大西煎服五  
五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷  
房室傷飢傷勞傷經絡榮衛氣傷內有乾血  
肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛淋之一長杏

頭風摩散

散

大附子一枚鹽等分

右二味為散沐足以方寸匕已摩疾止令藥  
氣行



○芍藥甘草大棗三味雖有小異其所主治則掣急也桂枝湯有此三味而方極不言掣急症者以不待其言而可知故也方極桂枝加芍藥湯下云本方症而拘攣劇者桂枝去芍藥湯下云本方症而不拘攣者桂枝加芍藥生姜人參湯症云或拘攣可以見已

桂枝湯不言拘攣小建中湯不言上衝其他如八味丸半復瀉心湯等

類聚方集覽比那至二三

日本之那南總處雜雜問煥子炳標注

開半日精全三那蓋其男重其適之適校

桂枝湯入治上衝桂枝頭痛桂枝發熱桂枝汗出桂枝惡

風桂枝生薑者桂枝出蘇武對蘇那不必

桂枝芍藥生薑各三兩大棗十二枚今用各七分五厘

厘 甘艸二兩五分 以水一斗

右伍味以水一斗升微火煮取三升去滓

症一藥不必相對  
要之諸方皆衆藥  
併力以成其功耳  
故每證注其主藥  
者唯示綱概而已  
○按其發汗也有  
非如水流滴病必  
不除者又有大汗  
出後風氣去溼氣  
在者不可一概而  
論之宜慎之

適寒溫服一升今以水一合四服已須臾飲  
熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許遍  
身發熱微似有汗者益佳不可令如水流滴  
病必不除若一服汗出病差停後服不必盡  
其劑若不汗更服依前法又不汗後服小促其  
間半日許令三服盡若病重者一日一夜服  
周時觀之服其劑盡病症猶在者更作服若  
汗不出者乃服至二三劑

○九稱太陽者主  
桂枝麻黃葛根等  
之症是  
中風者猶言傷風

○煩者苦悶之謂  
而是眩眩也雖眩  
眩病未得除故又  
用桂枝湯也

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱  
者汗自出。蓄蓄惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。鼻  
鳴乾嘔者。太陽病頭痛發熱汗出惡風者。  
○太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯。  
方用前法。若不吐衄者不可與之。○太陽病  
初服桂枝湯反煩不解者。先刺風池風府。卻  
與桂枝湯則愈。○太陽病二日已發汗若吐  
若下若溫鍼仍不解者。此為壞病。桂枝不中。

與也觀其脉證知犯何逆隨證治之○桂枝

本為解肌若其人脉浮緊發熱汗不出者不

可與也常須知此勿令誤也○若酒客病不

可與桂枝湯得湯則嘔以酒客不喜甘故也

○太陽病外證未解脉浮弱者當以汗解之

太陽病外證未解者不可下也下之為逆欲

解外者○太陽病先發汗不解而復下之脈

浮者不愈浮為在外而反下之故令不愈今

脈桂枝湯

胡漢未詳謂如又

而具謂如

○脈桂枝湯

中風桂枝湯

之垂吳

此桂枝黃其桂枝

○或謂大醫家

○頭痛有熱，但挂  
枝症而已。若六、七  
日不大便，且小便  
不清者，乃承氣症  
也。服承氣湯，則上  
衝得降，若小便清  
者，宜服挂枝湯。  
○先其時發汗者，  
凡治潮熱之要術，  
也不潮，則不得曰  
時發熱。曰先其時  
也。余常治今稱瘧  
者，若遇上衝發熱

脈浮，故知在外。當須解外，則愈。○病常自汗  
出者，此為榮氣和，榮氣和者，外不諧，以衛氣  
不共榮氣和諧，故爾。以榮行脈中，衛行脈外，  
復發其汗，榮衛和，則愈。○病人藏無他病，時  
發熱，自汗出而不愈者，此衛氣不和也。先其  
時發汗，則愈。○傷寒不大便六七日，頭痛有  
熱者，與承氣湯。其小便清者，知不在裏，仍在  
表也。當須發汗。若頭痛者，必衄。○傷寒發汗

汗出等症，則以桂枝湯先其發熱時溫服，須臾，歛熱稀粥，溫覆，以待其發熱而取汗，或遇柴胡白虎等症，乃各隨症處方服之。如桂枝湯法，凡療瘧皆一服，即愈。其他潮熱似瘧者，其治皆同。蜀漆散即截瘧藥也。其下云未發前服，亦先其時之謂也。

解半日許，復煩，脈浮數者，可更發汗。○傷寒醫下之續得下利，清穀不止，身疼痛者，急當救裏，後身疼痛，清便自調者，急當救表。救裏宜四逆湯，救表宜桂枝湯。○太陽病發熱汗出者，此為榮弱衛強，故使汗出，欲救邪風者，○傷寒。天下後復發汗，心下痞惡寒者，表未解也，不可攻痞。當先解表，表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯，攻痞宜大黃黃連瀉心湯。○陽

○復煩者病未盡故也。小柴胡湯有此例，宜併觀。

○清便自調者謂

清穀止也。清穀雖

止，身疼痛未愈者

猶宜四逆輩，恐非

挂枝湯症。

○稱陽明病者有

潮熱，謔語，燥屎等

之症是也。

○下利腹脹滿，以

下三條皆非挂枝

湯症，與清便自調

條義同。

則病脈遲，汗出多，微惡寒者，表未解也。可發

汗。○病人煩熱，汗出則解。又如癰狀，日晡所

發熱者，屬陽明也。脈實者，宜下之。脈浮虛者

宜發汗。下之與大承氣湯，發汗宜挂枝湯。○

太陰病，脈浮者，可發汗。○下利腹脹滿，身體

疼痛者，先溫其裏，乃攻其表。溫裏，四逆湯。攻

表，挂枝湯。吐利止而身痛不休者，當消息

和，解其外。宜挂枝湯少和之。○下利後身疼

新差同

新差同

新差同

新差同

新差同

新差同

新差同

新差同

新差同

新差同

新差同

新差同

新差同

痛清便自調者急當救表宜桂枝湯發汗

婦人得平脉陰脉小弱其人渴不能食無寒

熱名妊娠桂枝湯主之於法六十日當有此

症設有醫治逆者却一月加吐下者則絕之

①產後中風續之數日不解頭微痛惡寒

時時有熱心下悶乾嘔汗出雖久陽且証續

在耳服桂枝湯大汗出脉洪大者與桂枝

湯如前法若形如癰且再發者汗出必解宜

湯條無域焉於此條域者恐轉訛



奔豚主劑雖居多，特加桂湯為最可也。○又灸後有灸大熱，不止是火邪也。今謂之炷熱，又插炷熱此方。面乏生平頭痛，有時發者，之一二日或四五日，其甚則昏迷吐逆，絕飲食，惡藥氣者，每發服此，則速起。○或每天陰發，兩頭痛者，亦膏服之，能免其患也。○燒鍼下恐有脫誤。

卦掛枝五麻黃一湯本方證而上下所擊者  
掛枝加桂湯之治本方證而上衝劇掛枝者  
於掛枝湯方內加桂五兩大實麻黃桂枝  
本桂枝錢芍藥大棗生姜路蘇甘州  
右五味煮如本方  
燒鍼令其汗鍼處被寒枝起而赤者必發奔  
豚氣從少腹上衝心者灸其核上各一壯與  
卦掛枝加桂湯 本方證而上下所擊者

此方治腹拘攣劇者誠然然遍身拘攣皆治之則腹字恐衍文○治奔豚拘攣劇者東洞子曰腹滿時痛者拘急而痛也是以芍藥為主爾○舊刊有脫文故今收之其其問有發者之一二日藥文主平應讀本和

桂枝加芍藥湯 治本方證而腹拘攣劇倍加者倍加芍藥於本方內加芍藥三兩各一分各一分與桂枝大棗生姜各六分芍藥一分甘草四分右五味煮如本方

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝加升大黃湯主之各本方證而土濟懷桂枝加芍藥湯一治本方證而腹不拘攣去芍藥按脈促胸滿非此方所主而舊刊不刪者恐寫誤然若刪脈促胸

滿則有方而無症焉又挂枝湯中去芍藥則其義可說而其方不可用也蓋或變方或合方出於此方者不少故存以備參觀

中開界不一開之義

翰然其說言率皆

拙古古雖言然不

昔主之

以爲蘇蘇蘇蘇

○藥劑言及藥

驚癩及破傷風角弓反張者即項背強急凡凡之狀也宜此方

者調蘇於挂枝湯方內去芍藥

挂枝大棗生姜各九分甘草六分

右四味煮如本方姜各六分 甘草各四分

太陽病下之後脈促胸滿者挂枝去芍藥湯

主之若微惡寒者去芍藥方中加附子湯主

之調蘇更皆惡凡凡又下出惡風

挂枝加葛根湯治挂枝湯證而項背強急

者挂枝於挂枝湯方內加葛根四兩

廣泰凡凡之雜也

言入肅肅明更昔

繁疎及舉壽風前

○病角弓反張者此為痙瘓病有渴者主之

此方方極言似不詳然其死言率實簡者示一隅之義也我悲子弟不能遽見而知其益與故往往贅言以詳悉其主症以示企及之徒已

桂枝芍藥大棗生姜

各六分

甘草

四分

葛根

八分

桂枝芍藥湯

治桂枝湯證而渴

○太陽病項背強几几反汗出惡風者

桂枝芍藥湯

治桂枝湯證而渴

括蔓者主

於桂枝湯方內加括蔓根二兩

桂枝芍藥大棗生姜

各六分

括蔓甘草

各四分

右六味煮如桂枝湯

○太陽病其證備身體強几几然脉反沉遲此

○東洞子曰黃耆主治皮膚水氣可考藥錄○千金外臺並用黃耆五兩

○黃病宜利小便者用茵陳五苓散類當以汗解之者用麻黃湯酒湯類有自汗盜汗而身重者用此方世稱勞瘵者多如此故曰勞氣也日久將斃之間生惡瘡者間有之然則用七寶丸搗肉散類而救勞瘵者蓋亦有之志于仁者宜深思焉

為瘰

桂枝加黃耆湯

治桂枝湯證而黃汗

黃耆自汗

桂枝湯

黃耆盜汗者黃耆於桂枝湯方內加黃耆二兩

桂枝芍藥大棗生姜

各六分

甘草黃耆

四分

右六味煮如桂枝湯

黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食

已汗出又身常暮盜汗出者此勞氣也若汗

出已反發熱者久久其身必甲錯發熱不止

按諸病黃家條備  
參考者而已

○甲錯者皮膚枯  
燥鱗甲錯出也

按當以汗解之者  
非此方所主也

○東洞子曰桂枝  
加大黃湯因桂枝  
加芍藥湯加大黃  
者也故方名從之  
矣

○治小兒宿食不  
化而腹痛者若嘔

者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久久必

身濶即胸中痛又從腰以上必汗出下無汗

腰髖弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身

疼重煩燥小便不利此為黃汗○諸病黃家

但利其小便假令脈浮當以汗解之

桂枝加芍藥湯治桂枝加芍藥湯證而

有停滯人者

於桂枝加芍藥湯方內加大黃一兩

者倍大黃凡用此方宜倍加大黃

或至是入諸藥... 桂枝大棗生姜各六分芍藥錢甘草四分大

黃二分右六味煮如桂枝湯

太。陽。病。醫。反。下。之。因。爾。腹。滿。時。痛。者。屬。太

陰。也。桂。枝。加。芍。藥。湯。主。之。大。實。痛。者。桂。枝。加

大。黃。湯。主。之。

桂。枝。加。厚。朴。杏。子。湯。治。桂。枝。湯。證。而。胸。滿。厚

微。喘。者。

於。桂。枝。湯。方。內。加。厚。朴。二。兩。杏。子。五。十。個。

大實痛者拘急殊甚腹中大結實而痛也  
○東洞子曰賞有胸滿症  
按曰當有胸滿症當有上衝症類皆經文其症闕故補之也以下做之

○灸刺諸藥不能  
治抵當用此方至  
言哉此方之妙起  
死起廢不可勝數  
也余常見中風卒  
倒或癱瘓不語破  
傷風牙關緊急失  
音傷寒厥逆四逆  
輩不能救者若向  
死冷汗如膏或腹  
中切痛及驚風癩  
風痛風白虎歷節  
一切逆冷不仁諸  
癩癢疾諸藥不能  
救者屢與此湯得  
効至多又諸瘡癰用

桂枝芍藥大棗生姜

各六分

甘草厚朴杏子

各四分

右七味煮如桂枝湯

喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳○天陽病下

之微喘者表未解故也

烏頭桂枝湯

治腹中絞痛頭烏手足逆冷頭烏或

不仁頭烏若疼痛頭烏者

烏頭五枚

錢三

右一味以蜜二斤煎減半去滓以桂枝湯五

之內托排膿之功至速也最可奇者走馬湯備急



圓紫圓等方下。又稱諸卒暴急病以此方起死回生者如神皆余平生必得也。古語曰病者苦急，則急食甘以緩之。全哉此言烏頭和蜜則如龍乘雲矣。然膜眩亦不少始宜少與之，不知乃加之，此蓋抵當之謂乎。如上及謂諸難証急病非大毒驗烈劑則不能抵當，世人漫畏膜眩多難服之者豈不嘆哉。

○東洞子曰是烏頭煎而合挂枝湯

合解之得，升後初服，二合，不知即服三合。

又不知後加至五合，其知者如醉狀得吐者。

為中病，以水九勺煮烏頭取三勺，去滓內蜜六勺，再煎取六勺，別煮挂枝湯取六勺。

勺合之，服八勺，按若輕病則挂枝湯加烏頭相和以水煮服亦可也。法依挂枝湯然不

及蜜煎。○寒在腹中痛逆冷手足不仁若身最重者。

疼痛灸刺諸藥不能治，抵當用此方。

挂枝加附子湯，治挂枝湯證而惡寒，附子支節

微痛，附子者芍藥者。

方也當列烏頭煎

方移今列之挂枝

加附子湯者示其

異也又按煎法可

依天烏頭煎之法

挂枝加附子湯

治後世所謂痛風

者又曰小便難是

附子餘力足以治

之也

全若丸言烏頭煎

頃余食甘以越之

古語曰麻者苦參

於挂枝湯方內加附子一枚

挂枝芍藥大棗生姜各六分  
甘州附子三分

右六味如挂枝湯煮之服

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四

支微急難以屈伸者

挂枝去芍藥加附子湯治挂枝去芍藥湯證

而惡寒者

於挂枝去芍藥湯方內加附子一枚

○去其味○去其味

○東洞子曰當有上衝症此方與桂枝去芍藥加附子湯同而治與方名異彼方下云微惡寒此方下云身體

桂枝大棗生姜

各七分五厘

甘草附子

五分八厘

右五味煮如桂枝湯

太陽病下之後脉促胸滿者桂枝去芍藥湯

主之若微惡寒者去芍藥方中加附子湯主

之

桂枝附子湯治桂枝去芍藥湯證而身體疼

痛不能自轉側

附子大棗甘草

者

桂枝四兩

八分

附子三枚

九分

甘草二兩

四分

生姜

疾煩惡寒輕，疾煩重，獨在附子多少也。

也。

○今稱痛風者，及上衝難降者，主之

皆宜加米。

○曰不嘔不渴者，

身疼外無所患之謂也。不與生薑相

關。

○去桂加米湯者，

即白米附子湯也。

曰大便鞅，小便自

利者，去桂加米大

似不可解者，且用附子，方多而獨稱服後身痺如冒狀，則眩暈為

三兩大棗十二枚

各六分

甘草二兩

右五味以水六升，煮取二升，去滓，分溫三服。

以水一合八勺，煮取六勺。

傷寒八、九日，風溼相搏，身體疼煩，不能自轉

側，不嘔，不渴，脈浮虛而澹者，桂枝附子湯主

之。若其人大便鞅，小便自利者，去桂枝加米

湯主之。

桂枝附子去桂加米湯

治前方證而大便鞅

甚亦可怪因屢試附子膠脰則效速而合窻則如別人皆知之又用此方其  
入大便硬則脰脰  
大養功粗似合窻  
者若以桂苓芍藥  
類加此方以用之  
或用之太便不韋  
之人則脰脰稍少  
得効亦微然則大  
便韋若附子成効  
之機也病解而大  
便亦通此是附子  
餘力所及也蓋桂  
苓芍有降衛通解  
拘攣壓動悸之力  
故胸腹開爽脰脰  
直差此無他藥氣

附子小便自利此不上衝桂者

於桂枝附子湯方內去桂加朮四兩四

右五味以水三升煮取二升去滓分溫三服

又服覺身痺半日許再服三服都盡其人如

冒狀勿怪即是朮附並走皮中逐水氣未得

除故耳則雖小便自利

附子九分朮八分甘草四分大棗生姜各六分

右五味煮如本方此方與前方不同

走而下以不暇止而攻病故也甘草

大棗之甘則緩其

急而停壅於其氣

令不得走故附

子力以追逐水氣

此所以順眩也

小便自利者水之

積畏於不利故溢

出者也

桂枝去桂加苓

朮附湯桂枝加苓

朮湯桂枝加苓朮

附湯桂枝加朮附

湯皆從此方變者

也隨症用之或功

傷寒八九日風溼相搏身體疼痛不能自轉

側不嘔不渴脉浮虛而濡者桂枝附子湯主

之若大便鞅小便自利者

桂枝去桂加苓朮湯治桂枝湯證而悸者

便不利者不上衝者

於桂枝湯方內去桂加苓朮各三兩

芍藥大棗生薑茯苓各六分甘草四分

右六味煮如桂枝湯

其多且加苓朮附湯最治痛風病自小便去然此數方

未知其所出也

頭項強痛發熱無汗與此方相違疑總似葛根湯症

又實難得而治

東洞子曰證不

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無

備也此方合桂枝

去芍藥湯與麻黃

心下滿微痛小便不利者

附子細辛湯也證

桂姜棗艸黃辛附湯

治桂枝去芍藥湯與麻

當於四方之証

也藥徵有辨

黃附子細辛湯一方證相合者

按藥徵云桂姜棗

艸黃辛附湯枳朮

桂枝生姜各三兩大棗十二枚

各六甘草麻

湯一方同因証

煥按金匱要畧二

黃細辛各二兩

附子一枚

分三

方相攝連且二方

言證正同而枳朮

右七味以水七升煮麻黃去上沫內諸藥煮

湯位不日氣分耳

此枳朮湯不謂因

取二分分溫三服當汗出如魚行皮中即愈

也而吉子曰二方  
同因者何也抑是  
與腎氣丸亦主之  
麻黃甘草湯亦主

以水一合四  
勺煮取六勺  
三服當代出此  
氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作

之類一例也故氣分字管枳朮湯而二方同因也夫氣血固不拘然既  
曰氣分豈無說乎長沙方中曰亦主之者多有焉因並觀之凡主皆一毒而  
毒所在之部位則有表裡上下之不同也此一方亦雖同曰氣分乎實有  
氣血之別焉一則心下堅大而屬血分者一則心下堅大而屬氣分者直  
指方云氣為痰飲死膈心下堅脹名曰氣分加味枳朮湯瘀血留滯血化  
為水四肢浮腫皮肉赤紋名曰血分調榮飲入門亦粗同此因金匱立說  
雖不出古欲強別氣分血分則足以為微乎麻黃附子細辛湯下吉子曰  
有痰飲之變也者非一定之證也心下堅大證調榮飲證並可稱痰飲  
之變之一也且曰當汗出如虫行皮中即愈此亦病在皮表與調榮飲證  
相同也因是觀之杜姜棗朮黃辛附湯為血分也明矣夫氣血不拘者固  
又實難別而諸家別之者蓋以皮肉赤紋為瘀血之變乎壹是皆水氣也  
故吉子謂之痰飲之變金匱云地人則經水不通經為血血不利則為水



名曰血分諸家因曰聚血化為水吉子以為水與血同也學者思諸

如五... 門... 又...

如五... 門... 又...

如五... 門... 又...

如五... 門... 又...

如五... 門... 又...

如五... 門... 又...

如五... 門... 又...

如五... 門... 又...

如五... 門... 又...

如五... 門... 又...

如五... 門... 又...

如五... 門... 又...

如五... 門... 又...

如五... 門... 又...

如五... 門... 又...

如五... 門... 又...

如五... 門... 又...

桂枝去芍藥加皂莢湯治桂枝去芍藥湯證

桂而吐濁唾涎沫皂莢者骨桂也

於桂枝湯方內去芍藥加皂莢二枚

盃桂枝生薑大棗各七份甘草皂莢各五份

夫右五味煮如桂枝湯煎取四升

肺痿吐涎沫者寸氣微咳

桂枝加龍骨牡蠣湯治桂枝湯證而胸腹

龍骨有動者內心驚骨蒸各三兩

脈動

○又手冒心者主  
之是近方傷寒門  
升陽散火湯症而  
胸腹有動者也

○小腹弦急與挑  
按承氣症小腹急  
結異也常從小腹  
引陰頭弦急且晝  
夜思色五七者是  
也男女正同又陰  
吹正喧玉門不閉  
時自漏精者主治與夢交同矣

於桂枝湯方內加龍骨牡蠣各三兩

桂枝湯芍藥大棗生姜龍骨牡蠣各四分甘

草分三右七味煮如桂枝湯

夫失精家小腹弦急陰頭寒目眩髮落脉極

虛花遲為清穀亡血失精脉得諸花動微緊

男子失精女子夢交藥時身莖二姓

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯 治桂枝去

芍藥湯證而胸牡腹龍有動劇蜀者藥

時自漏精者主治與夢交同矣。如蜀漆龍骨牡蠣湯東洞子曰當有

凡腹動而衝逆證。近方黃連解毒湯證而暴熱至危者主之。又灸後大熱。諸藥不能治者主之。

桂枝生薑蜀漆各三兩大棗十二枚各四分五厘

牡蠣五兩九分五厘龍骨四兩六分甘草二兩三分

右為末以水一斗二升先煮蜀漆減二升肉

諸藥煮取三升去滓溫服一升以水二合四勺煮取七勺

傷寒脈浮醫以火迫劫之凶陽必驚狂起臥

不安者○火邪者煎桂枝湯

桂枝加芍藥生薑人參湯治桂枝湯證而心

下痞鞭人參或拘攣芍藥及嘔生者西入卷三兩

東洞子曰當有心下痞鞭或拘急或嘔症

○脉沈遲，字東洞  
子不刪者，示不拘  
脉，強弱也。其他脉  
促、弱、等、當、刪、而  
不刪者，多有焉。蓋  
雖脉候之惡，以不  
足畏，故也乎。

○皮膚燥痒者，主  
之。又治癩疾，服如  
桂枝湯法。

桂枝湯方內加芍藥、生姜各一兩，人參三兩。

桂枝大棗人參湯各六分芍藥、生姜各八分、甘州

右六味煮如桂枝湯

發汗後身疼痛，脉沈遲者，用桂枝湯證多麻黃湯證。

桂枝二麻黃一湯治桂枝湯證多麻黃湯證。

少者，木桂枝一兩十七銖八分五厘芍藥、生姜各

廿兩六銖，大棗伍枚各六分麻黃半六銖，杏仁

十六個各三分五厘甘州一兩二銖五分五厘

主之

變發斑且辛皆皆

愈大疎熱愈之謂

又曰寒熱皆來中

風穢衣穢皆主之

而學悉而上衝者

主之

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫

肉諸藥煮取四升去滓溫服四升日再一以水

五升煮取四升服桂枝湯大汗出脉洪大者與桂

枝湯如前法若形如瘧日再發者汗出必解

桂枝二越婢半湯 治桂枝湯證多越婢湯證

少者煎桂枝芍藥甘草麻黃各十八銖四分五厘

生姜一兩三分三銖七分大棗四枚石膏二十四銖

各六分去上右采味咀以五升水煮麻黃一

二沸去上沫內諸菜煮取三升去滓溫服一

升

以水一合六勺煮取六勺

○太陽病發熱惡寒熱多寒

少脈微弱者此無陽也不可發汗

桂枝麻黃各半湯 治桂枝湯麻黃湯二方證

相合者前志云桂枝湯麻黃湯二方證

桂枝一兩十六銖

五分五厘

芍藥生姜麻黃甘草

各一兩大棗四枚杏仁二十四個

各二分

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫

○治瘧疾服之如桂枝湯法

風癰疥癩皆主之  
又曰寒熱往來中  
或大病將愈之時  
身發斑且痒者皆  
主之

○小建中湯東洞  
子曰當有腹中拘  
急之證其方類芍  
藥甘草湯也昔黃  
治痢疾阻宜服之  
與小建中湯不差  
者拘急雖緩乎以  
太甜故胸腹苦悶  
未爽快也因用小  
此胡湯而後始洗  
然契如七寶丸有  
後方亟謂再快也  
說具於備急圓標

內諸藥煮取一升，剗合，去滓，溫服。陸合，以水

六勺煮

取六勺煮，或下，去昔與小建中湯，或下之。○對寒

太陽病得之八九日，如瘧狀，發熱惡寒熱多，

寒少，其人不可嘔，清便欲自可，一二日，二三度發

脈微緩者為欲愈也。脈微而惡寒者，此陰陽

俱虛，不可更發汗，更下，更吐也。面色反有熱

色者，未欲解也。以其不能得少汗出身必痒。

小建中湯

治裏急

膠

腹皮拘急

芍藥

及急痛

悸而煩者非此方  
所主。雖然若心煩  
而拘急甚，乃昏沈  
恍惚者，先用此方，  
一日而別。按方以  
治煩悸，乃致功。至  
連  
悸以下裡急之  
傍證也。此諸症皆  
兼拘急，則宜服之。  
又曰：男子黃者黃  
疸未發，見而在腹  
內，故大便溏而色  
深黃，或謂黃痢也。  
小便自利及不利，  
頻數淋瀝，因急迫  
而生者，皆主之。又曰：急迫帶下便膿血，或淋痢黃小便

芍藥者

桂枝甘草生姜各二兩大棗十

二枚

各四分  
五厘

芍藥六兩

九分

膠飴一升

三錢

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更

上微火消解溫服一升日三服

以水一合四  
勺煮取六勺

去滓內膠

嘔家不可用建中湯以甜故也○

傷寒陽脈溢陰脈弦法當腹中急痛者先與

小建中湯不差者與小柴胡湯主之○傷寒

二三日心中悸而煩者○虛勞裏急悸衄腹



自利衄遺指手足煩熱口乾等症用膠節與它症不同余別有考。東  
洞子曰桂枝加芍  
藥湯當入于此而  
以有桂枝之名列  
于彼。

○東洞子曰當有  
盜汗之證。

宜東洞子曰桂枝  
加黃耆湯症而嘔  
無急迫者無急迫者

中痛夢失精四肢痠痛手足煩熱咽乾口燥

①男子黃小便自利 ②婦人腹中痛去濕愈

黃耆建中湯對治小建中湯證而盜汗黃耆汗

黃或自汗黃耆者當益重困寒發汗出因不親

於小建中湯方內加黃耆矣兩半三厘曰夫

虛勞裏急諸不足煎取二升盛服小合日三

黃耆桂枝五物湯 治桂枝湯證而嘔倍加身

體麻痺黃耆不急迫去甘者十二升六升主

○此方治後世所謂麻木而滋膚湯症者著黃薑而宜隨証加木并外

蓋代文鑑  
○東臨子曰當亦

于楚

以并并并并并并

藥散當入于此而

既于日并并并并

自陸馳蓋器于氣

黃耆芍藥桂枝各二兩大棗十二枚各六分生

黃姜六兩二錢并并并并并并生薑

右五味以水六升煮取二升溫服七合日三

服以水一合八勺○血痺病從何得之師曰夫

尊榮人骨弱肌膚盛重困疲勞汗出卧不時

黃動搖加被微風遂得之但以脉自微潛在于

口關上亦緊宜鍼引陽氣令脉和緊去則愈

血痺陰陽俱微寸口關上微尺中亦緊外證

自陸馳蓋器于氣

謂之為瘧疾與瘧熱之類皆主之

藥下不結言不

知寒熱瘧疾而

沾衣正黃謂黃

汗出至多也

治水瘡身重汗出

者又辛冒心赤亦

按當有從小腹引

陰弦急症說見干

桂枝加龍骨牡蠣

湯標然彼主胸腹

有動此是身體腫

與多汗

宜隨證加末

半身體不仁如風痺狀歲半夏土衛林意

黃耆桂枝若酒湯 治身體腫黃耆若酒發熱汗出

桂枝占衣黃耆枝色正黃如藥汗黃耆若酒者

黃耆五兩芍藥桂枝各五兩煎取三升

若連味以苦酒升七升相和煮取三升

桂温服草外以苦酒合四勺煎取六升當心煩服至六

也田乃解若心煩不止者以苦酒和故也○

黃汗之為病身體腫發熱汗出而渴狀如風

類聚方集覽上

千九

宜煎諸味

與之

○藥洞子曰嘗有

急迫證熱斯主

封封吐諸骨封難

射射急急驚具干

熱覺在對小頭臣

味又手冒心者亦

因止衝也重下出

干出至也

○或亦五黃器黃

○喉痺腫痛甚而

湯藥不下語言不

能或為痰涎壅盛之狀者主之

水汗沾衣色正黃如藥汗脈自沈何從得之

師曰以汗出入水中浴水從汗孔入得之

桂枝甘草湯

合臣止衝

桂枝甘草湯急迫

桂枝四兩 炙甘草二兩 鐵棗三枚 擘

右葶味以水三升煮取升外去滓頓服以水

外為煮發汗過多其人叉手自冒心下

黃悸欲得按者

黃悸欲得按者黃

半夏散及湯

治咽喉痛甘上衝桂急迫甘

者附子桂枝甘草半夏各等分一錢

桂枝三味各別搗篩已合治之白飲和服方

寸匕日三服若不能散服者以水一升煎七

沸內散兩方寸匕更煎三沸下火令少冷少

少嚥之○少陰病咽中痛表氣鬱結不散風

桂枝甘草附子湯治桂枝甘草湯證而骨節

煩疼附子小便不利木者桂枝附子湯治

甘草术各四兩分六附子二枚分九桂枝四兩一錢

。即甘艸附子湯  
東洞子曰當有衝  
逆之症  
治後世所謂痛風  
歷節風手逆之則  
痛劇者

蘇勝茶

風痛風平並之阻

守針世內監蘇風

數文並

東風子曰當言濟

。唱甘州節于燕

時變古書卷上

十九

分二草木右四味以水六升煮取三升去滓温

服六升日三服初服得微汗則解能食汗出

桂復煩者服五合恐汗升多者服六七合以水

取六勺二勺煮○風溼相搏骨節疼煩掣痛不得屈

伸逆之則痛刺汗出短氣小便不利惡風不

欲去衣或身微腫者諸風皆以水一升煎之

桂枝甘草龍骨牡蠣湯治桂枝甘草湯證而

胸牡腹有動骨及急迫倍甘者

○火逆以下恐有  
脫誤

謹按此方桂枝甘  
艸主藥則桂枝甘  
艸湯症而吐下心  
下痞鞭小便利  
者主症也人參湯  
即桂枝人參湯症  
而不上衝者主之

桂枝一两

四分

甘草牡蠣龍骨各二两

九分

右為末以水五升煮取三升半去滓溫服八

合日三服

以水一合二升

正氣

火逆下之因燒鍼煩躁者

桂枝人參湯

治人參湯證而上衝

桂枝

急迫

甘草

者

桂枝甘草各四两

八分

人參乾姜各三兩

六分

右五味以水九升先煮四味取五升內桂夏

人參湯下稱急痛者余竊疑轉訛且如胸痹胸滿逆搶本是枳實薤白桂枝湯專主治之曰人參湯亦主之者示臨機應變之略耳非專主之症也又曰利下不止曰霍亂故知二方用乾薑者為治吐與下利。協與挾通。藥入則吐者宜加欬秀水搜采。

煮取三升溫服一升日再夜一服

以水一合八勺煮取

六○太陽病外證未除而數下之遂協熱而

利利下不止心下痞鞭表裏不解者

人參湯

即理中丸也

治心下痞鞭

人參小使不利本

或急痛甘草或胸中痺干姜者

人參甘草朮乾姜各三兩

七分五厘

右四味搗篩為末蜜和丸如雞黃大以沸湯

數合和一丸研碎溫服之日三服夜二服腹



腎氣動，所謂腎  
間動也。常人有之  
者，其動劇而引胸  
脇者，牡蛎所治也。  
此稱臍上築者，差  
後不了了，虛羸，故  
其動發露者，乃桂  
枝人參湯証。已何  
必去木，且長沙方  
中間有加減法，不  
足取。

中未熱，益至三四丸。然不及湯。湯法以四物

依兩數，切用水八升，煮取三升，去滓溫服。

升，日三服。以水一合六加減法若臍上築者

腎氣動也。去木，加桂四兩，吐多者去木，加生

姜三兩，下多者還用木，悸者加茯苓二兩，渴

欲得水者，加木，足前成四兩半。腹中痛者，加

人參，足前成四兩半。寒者加乾姜，足前成四

兩半。腹滿者，去木，加附子一枚。服湯後如食

。熱物入腹中而  
自覺熱不快者此  
胃上有寒之候也  
。東洞子曰當有  
衝逆嘔吐症  
此方與五苓散相  
表裏也說見于五  
苓散條

頃飲熱粥一升許微自溫勿發揭衣被○霍

亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散

主之寒多不用水者理中丸主之○大病差

後喜唾久不了了者胃上有寒當以丸藥溫

之○胸痺心中痞留氣結在胃胸滿脇下逆

搶心枳實薤白桂枝湯主之入參湯亦主之

茯苓甘草湯治心下悸而吐衛挂嘔生者

茯苓桂枝各二兩一分生薑三兩一分甘草一

咳者亦衣纁能治也。咳者三合服之。通氣。川芎。衣。凡走鹽。以青鹽。

也。

高。纁。或。其。子。甚。有。

。心。野。開。而。少。針。

。按。厥。也。者。逆。也。

。衝。逆。者。必。頭。汗。出。

。若。頭。汗。出。多。兼。嘔。

。悸。者。此。方。主。之。

。下。利。逐。文。好。地。衣。

。東。師。七。日。當。家。以。

。實。有。微。喘。之。症。

兩<sup>四</sup>分。右四味以水四升煮取二升去滓分

溫三服

以水一合。三服。勺煮取六勺。頭六。

傷寒汗出而渴者五苓散主之。不渴者。傷

寒厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草

湯卻治其厥。不爾水漬入胃必作利也。

茯苓杏仁甘草湯。治悸<sup>茯苓</sup>而胸中痺<sup>杏仁</sup>者。

茯苓三兩

一錢五分

杏仁五十個

一錢

甘草一兩

五分

右三味以水一斗煮取五升溫服一升日三

服不差者更服

以水一合二勺煮取六勺

服一十日

胸膈胸中氣塞短氣茯苓杏仁甘草湯主之

枳實姜湯亦主之

或桂枝而胸中寒者

茯苓戎鹽湯治心下悸

茯苓小便不利者

茯苓半斤

二錢四分

朮二兩

六分

戎鹽彈丸大

三分

右三味先將茯苓朮煎成入鹽再煎分溫三

服

以水一合二勺煮取六勺去滓內鹽令消服

小便不利蒲灰散主之滑石白魚散茯苓戎

東洞子曰當有心下悸症又按此方煎法不審依他例當以水六升煮取三升去滓內戎鹽一二沸分溫三服。小便閉而心悸為難治此方甚奇也。心中悸而頭汗如流者亦難治也此方加桂三分服之或加川芎亦可。代戎鹽以青鹽

光可也。白魚者鯉魚也。

東洞子曰當有

心下悸症又按葵

子一斤本艸綱目

作三兩今役之

此方實治娠娠水

腫也域妊娠字者

恐轉訛

香二氣

習

東洞子曰嘗有

心下悸證

宜遺尿失禁者兼

用見于後編

鹽湯並主之味

葵子茯苓散 治小便不利葵心下悸苓腫滿

因小便不利者葵子一斤茯苓三兩

右二味并為散飲服方寸匕日三服小便利

則愈○○娠娠有冰氣身重小便不利洒淅惡

寒起即頭眩○習

苓姜朮甘湯 治心下悸○小便自利○腰中

冷如坐水中○若體重形如水狀○者

甘艸末各二兩五分乾姜茯苓各四兩錢一

右四味以水五升煮取二升分溫三服腰中

即溫以水一合二勺煮取六勺○腎著之病其人身體重

腰中冷如坐水中形如水狀反不渴小便自

利飲食如故病屬下焦身勞汗出衣裏冷濕

久久得之腰以下冷痛腰重如帶五千錢

苓桂朮甘湯 治心下悸茯苓上衝桂枝起則頭眩

甘艸桂枝小便不利者

○能療上衝急迫者病從小便去木

○腎著湯此方加杏仁治妊娠腫滿有驗

○此方合真武湯亦名桂枝加苓朮附湯而無大棗且茯苓為君與先出桂枝加苓朮附湯少異

○腎氣丸主小腹水氣此方主心下有飲者

○東洞子曰當有拘急證

茯苓四兩一分錢 桂枝三兩九分 朮甘草各二兩

六分 右四味以水六升煮取三升去滓分

溫三服以水一合二勺煮取六勺 傷寒若吐若下後心

下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沈緊發汗則

動經身為振振搖者心下有痰飲胸脇支

滿目眩夫短氣有微飲當從小便去之苓

桂朮甘湯主之腎氣丸亦主之

苓桂甘棗湯治臍下悸茯苓而攣急大棗上衝甘草

○續聚久久不愈  
顏色蒼然種種苦  
腦或似勞瘵者加  
味嚼煎服人家常  
用味嚼也主少下  
又病臥舉體愕然  
一振如有驚惕者  
其間十許息而後  
微愕振如此不止  
者服此乃漸愈  
又瘡發輒狂言不  
止噴嚏終日而臍  
下有動者主之且  
○苓桂五味甘艸  
湯以下五方皆骨  
蒸家要術

廿四  
苓桂者錢一分茯苓半斤一分甘草三兩四分大

棗十五枚五分桂枝四兩六分

右四味以水一斗先煮茯苓減二升內諸藥

煮取三升去滓溫服一升日三服以水二合煮取六分

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚芩桂

苓桂五味甘艸湯治心下悸芩桂上衝桂枝味五

急迫甘草者四分茯苓桂枝各四兩八分甘艸三

兩六分五味子半升一分錢一分朱甘草各二兩



○以下五方隨時活用之，則皆佳劑也。然隨症加減之法，其要言則似有理者，其實不足信之。何則？病隨時易轉，變其預期次序，必如此者，至稀也不可拘拘者也。抑以面熱為胃熱，上薰之候而加大黃者，實然。其說詳于調胃承氣湯標注。

右四味以水八升煮取三升，去滓，分溫三服。

以水一合六勺煮取六勺

⊕效逆倚息不得卧，小青龍湯

主之，青龍湯下已，多唾，口燥，寸脈沈，尺脈微。

手足厥逆，氣從小腹上衝胸咽，手足痺，其面

翕然如醉狀，因復下流，陰股小便難，時復胃

者，與苓桂五味甘州治其氣衝。

苓甘五味姜辛湯治前方證而不上衝。

去痰

飲滿

細辛  
乾姜

者五  
分茯苓四兩

六  
分

甘州乾姜細

右七味以水一斗煮取三升去滓温服半升

日三服

以水二合  
煮取六勺

○水去嘔止其人形腫者

加杏仁主之其證應內麻黃以其人遂痺故

不內之若逆而內之者必厥所以然者以其

人血虛麻黃發其陽故也

苓甘姜味辛夏仁黃湯治前方證而大便微

結

人者

茯苓四兩

四分

甘草乾姜細辛大

黃各三兩

三分

五味半夏杏仁各半升

六分

○東洞子曰以上  
五方當有驚悸肉  
瞤筋惕等症

。茯苓澤瀉湯東洞子曰。當有心下悸或小便不利症。煥按。當有大便秘結。症中嘔吐。蓋因心下有支飲也。吐而渴者。胃反吐水穀。而腹中空乏。故也。渴而飲。乃為支飲。服湯而夫飲下。則吐止渴差。故澤瀉之主治。非與渴者。以除心下支飲。故也。且澤瀉治支飲。見于澤瀉湯條。

右八味以水一斗煮取三升去滓溫服半升

正日三服以水二合煮取六分若面熱如醉此為胃熱

上衛薰其酒加大黃以利之苦胃却

茯苓澤瀉湯水治心下悸茯苓小便不利求上衛

桂及嘔吐澤瀉生薑渴欲飲水澤瀉者

茯苓半斤一分澤瀉生薑各四兩六分甘草桂

枝各二兩三分朮三兩四分

右六味以水一斗煮取三升內澤瀉更煮取

數而胃者五味子  
小便不利而胃者

澤瀉苦胃眩冒眩至

甚之謂也此症反

謂癲眩也又稱水

眩與癲癩相似而

非矣

桂枝主治衛逆故

與澤瀉俱治水逆

治中嗝病渴而

小便不利者又治

瘧疾服如桂枝湯然彼瘧病此飲煖水是為異耳又髮

二升半温服八合日三服

以水二合五勺先  
煮五味取八勺內

澤瀉更煮

○胃反吐而渴欲飲水者

澤瀉湯半治若胃眩瀉澤瀉小便不利者

澤瀉五兩二錢五分木二兩一錢

外右二味以水二升煮取一升分温再服以水

二勺煮○心下有支飲其人苦胃眩

五苓散治消渴澤瀉小便不利未或渴欲飲

水澤瀉入則吐澤瀉者

桂枝

脫每數十莖自脫落而空缺不毛地裡裡而有鬻者亦五苓所主也多因  
肛門及前陰生瘡或在脇漏下帶下後也小兒亦主之  
養生乳解毒劑又癩疔陰核腫大而痛者或小兒啼  
怒不止隨啼隨腫若啼怒止則陰腫亦減者及盤腸氣  
類皆主之又主婦人產門出真

澤瀉 兩六銖半八分猪苓 茯苓 木各十八銖

六桂枝半兩四分

右五味為末以白飲和服方寸匕日三服多

飲煖水汗出愈

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠

欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若

脈浮小便不利微熱消渴者發汗已脈浮

數煩渴者○甲風發熱六七日不解而煩者

○曰意欲飲水反  
不渴按欲飲者渴

故也此症初當以  
汗解之而不汗誤

灌冷水故毒內攻

而益煩是以水飲  
支滯心下無餘地

因雖煩渴而不能

飲故曰反不渴此

與水入則吐者一

也文蛤五苓皆為

散用者奇也且文蛤

表裏證渴欲飲水水入則吐者名曰水逆○

病在陽應以汗解之反以冷水灌之若灌之

其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲

飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓

散實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白

散亦可服○太陽病寸緩關浮尺弱其人發

熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下

之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉

散宜以白虎湯送下之若水飲凝結逆攻心胸者非

是五苓散所能治宜小陷胸湯或逆攻益劇衛迫咽喉者急與桔梗白散且白虎湯標注可

併考

五苓散與茯苓甘  
州湯互有表裏相  
散之力故用五苓  
散若不差者宜服  
茯苓甘州湯而後  
五苓散之功可見  
其勢如小柴胡湯  
於小建中湯是余  
數經驗者也  
○本以下之者言  
初太陽病之時誤  
下之也桂枝湯條  
曰攻痞宜瀉心湯

屬陽明也小便數者大便必鞫不更衣十日  
辭無辛苦也渴欲飲水少少與之但以法救之  
渴者○霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水  
者五苓散主之寒多不用水者理中丸主之  
○傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯  
苓甘草湯主之○男子消渴小便反多以飲  
一斗小便一斗腎氣丸主之脉浮小便不利  
微熱消渴者宜利小便發汗○假令瘦人臍

宜併觀

宜併觀

時太稠

本以

東洞子

小便不利或渴證

黃病宜縱小便

法之者上之豈必

持備前方症乎

東洞子曰當有便

膿血證

且白

且白

且白

且白

下有怪味涎沫而癩眩此水也○本以下之

故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥

煩小便不利者○限十散散小便又

茵陳五苓散出治發黃茵陳兼前方證者

茵陳蒿末十分五苓散五分散中大土二

右二物相先食飲方寸匕日三服○黃疸病

猪苓湯治小便不利澤瀉若淋瀝阿膠若渴

欲飲水猪苓若渴者大射必射更更十



煎代煎其衣

降者宜以八和式

喘者服前小下

○若脈浮云云按

五苓散症也

○陽明病云云按

自虎湯症也

猪苓茯苓白膠滑石澤瀉各廿兩

右五味以水四升先煮四味取中升去滓

取酒膠烱清温服七合且蒸服以水一合

冷補○若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者

此陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以

汗多胃燥猪苓湯復利其小便故也

陰病不利六七日效而嘔渴心煩不得眠者

猪苓散并添渴猪而心下悸茯苓小便不利茯苓者

豬苓茯苓各等分下利心野不陸水者

右三味并為散飲服方寸匕日三服嘔吐

而病在膈此後思水者解急與之思水者

牡蠣澤瀉散治身體水腫澤瀉腹中有動

牡蠣括而小瘦不利商陸者外不陸者

牡蠣澤瀉括蕞根蜀漆葶藶商陸根海藻等

右七味異擣下篩為散更入印中治之白飲

類服方寸匕下便利止後服日四服

白朮加赤芍豆等分  
无髮若無瘳瘳宜  
以甜遺紙之  
脚氣腫滿小便不利者宜以八味丸煎汁服此方

○八味丸東洞子曰外臺秘要作桂枝二兩附子二兩今從之○八味丸之症其六按臍下陷空沒指者其二小腹拘急及拘急引陰股者其三小便不利者其四小便反多者其五陰痿者皆主之聞之師云稱臍下不仁者學者可深思焉與他稱身體不仁者不同以飲一斗小便一斗言飲而直溺不暫停于中也與小便清利相似或云

天病差後從腰以下有水氣者一兩茯苓

八味丸治臍下不仁小便不利者

乾地黄八兩山茱萸薯蕷各四兩澤瀉茯苓

牡丹皮各五兩桂枝附子各二兩

右八味末之煉蜜和丸梧子大酒下十五丸

日再服若小便不利難禁飲者宜服小便

腳氣上入小腹不仁○虛勞腰痛少腹拘急

小便不利者○夫短氣有微飲當從小便去

男子有此病於婦人即為漏下實同症也婦人不有此症猶如男子無漏下故特稱男子消渴以明婦人無之然東洞子剛男子字蓋以為此症不限男子乎又茅歸膠艾湯下東洞子曰諸血症不別男女矣此漏下之主方也而其言如斯或以為應變審症則彼與是互用乎實是臆說已如其定義得君子是正。加牛膝車前子名玄英湯能治好

之苓桂朮甘湯主之腎氣丸亦主之○男子

消渴小便反多以飲一斗小便一斗腎氣丸

主之脉浮小便不利微熱消渴者宜利小便

發汗五苓散主之○婦人病飲食如故煩熱

不得卧而反倚息者何也曰此名轉胞不得

溺也以胞系了戾故致此病但利小便則愈

括藁瞿麥丸治心下悸夜小便不利瞿麥惡

寒附而渴括藁者括藁根二兩茯苓薯

娠轉胞不得瀉

○枯藁瞿麥九東

洞子曰當有心下

悸證

但有水氣之人而

曰渴此言可味夫

有渴者何拘熱有

無乎猪苓澤瀉皆

治渴者可以徵焉

○麻黃湯

○麻黃湯

○麻黃湯

○麻黃湯

○麻黃湯

○麻黃湯

黃各三兩附子一枚瞿麥九兩發其汗

右五味末之煉蜜九梧子大飲服三九日三

服不知增至七八九以小便利腹中溫為知

小便不利者有水氣其人若渴

麻黃湯而治喘杏仁而無汗麻黃頭痛發熱桂枝惡寒

麻黃湯而治喘杏仁而無汗麻黃頭痛發熱桂枝惡寒

個各九分桂枝二兩六分甘草一兩三分

右四味以水九升先煮麻黃減八升去上沫

○今試煮麻黃無上沫不拘而可也

其他麻黃劑皆同

○治瘧疾服如桂枝湯法

○啜粥亦良然有

眩暈葛根湯及諸

麻黃劑皆同

○黃芩湯同麻黃

○白朮湯言下相火

○麻黃湯入而

○麻黃湯

○麻黃湯

○麻黃湯

○麻黃湯

○麻黃湯

內諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微

似汗不須啜粥餘如桂枝法將息

以水二合煮取六分

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風

無汗而喘者○太陽與陽明合病喘而胸滿

者不可下○太陽病十日以去脈浮細而嗜

臥者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯

脈但浮者○太陽病脈浮緊無汗發熱身疼

痛八九日不解表證仍在此當發其汗服藥

○凡心腹痛按之  
痛止者是氣通也  
○傷寒耳前後及  
面上腫者風毒腫  
也宜早刺之不刺  
而自潰膿者危症

已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解  
以然者陽氣重故也○脉浮者病在表可發  
汗○脉浮而數者可發汗○傷寒脉浮緊不  
發汗因致衄者○陽明中風脉弦浮大而短  
氣腹都滿脇下及心痛又按之氣不通鼻乾  
不得汗嗜卧一身及面目悉黃小便難有潮  
熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過  
十日脉續浮者與小柴胡湯脉但浮無餘證

而自蒸艱者亦宜  
平日上衝難降者  
宜此方  
水病小便不利帶  
前方證者亦主之  
凡少頭証者

者與麻黃湯若不尿腹滿加噦者不治（金陽）

明病脈浮無汗而喘者發汗則愈不辨證

麻黃加朮湯但治前方證而小便不利者

於麻黃湯方內加朮四兩（外之原不無鼻草）

發麻黃杏仁（各七分）桂枝（五分）甘草（二分）朮（一分）

凡右五味煮如前方（發下）

濕家身煩疼可與麻黃加朮湯發其汗為宜

慎不可以火攻之（目即腫者必如此）



○東洞子曰水病而腫脹或喘或自汗出或無汗者主之  
此方與越婢加朮湯二方皆主水病而此方主在表之水氣故曰或自汗或無汗亦毒在肌表之症也

○東洞子曰當有惡寒症

麻黃甘州湯治喘急麻黃息迫甘或自汗或不

汗麻黃者麻黃甘州二兩一錢麻黃四兩二錢宜

右二味以水五升先煮麻黃去上沫內甘州

煮取三升溫服一升重覆汗出不汗再服慎

風寒四六○心創麻黃之二三日麻黃附子

裏水越婢加朮湯主之甘州麻黃湯亦主之

麻黃附子甘州湯治前方證而惡寒附子或微

痛附子者草各二兩一錢附子一錢五分

惡寒

○東風十日當

○少陰病者

惡寒脈沈小等是

也

○金匱注杏子湯

恐是麻黃杏仁甘

州石膏湯余按應

是麻黃杏仁薤白

甘州湯

○

○

○

麻黃甘草各二兩

附子一枚

七分五厘

右三味以水七升先煮麻黃而兩沸去沫

肉諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

○少陰病得之二三日麻黃附子

甘草湯微發汗以三三日無裏症故微發汗

也○求之為病其脈沈小屬少陰瘧者為風

無水虛脹者為氣水發其汗即已脈沈者宜

麻黃附子甘草湯浮者宜杏子湯

東洞子曰當有  
惡寒證兩式四和  
按變者無窮非一  
定之證豈為方之  
極乎蓋有深意乎  
別有考于日當有

東洞子曰當有  
煩渴證

麻黃附子細辛湯治麻黃附子甘草湯證而

不急迫

去甘

有痰飲之變

細辛

半兩

甘草

麻黃細辛各二兩附子一枚

七分

登厘不飲

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥煮取三升去滓服

一合四勺少陰病始得之反發熱脈沈者

麻黃杏仁甘草石膏湯治麻黃甘草湯證而

咳杏子煩渴石膏者麻黃四兩杏人五十

取四錢  
東師子曰當用

東洞子曰當有  
喘滿證外藿古今  
針驗作薏苡半斤  
麻黃四兩甘柳杏  
仁各二兩右四味  
以水五升者取  
升分温再服汗出即愈今從之。近方溼湯症者主之宜隨症加米

個甘柳二兩各四分石膏半斤一錢杏仁五十

麻右四味以水七升先煮麻黃減五升去沫

內諸藥煮取二升去滓温服六升以水一合

汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無

太熱者以水一斗麻黃杏仁薏苡甘草湯治前方證而不煩渴

無石有水氣者薏苡麻黃半兩八分甘草

麻黃兩杏仁五十個各四分薏苡仁半兩一錢

分各四分而

分各四分而

○凡麴室浴室井中窩中窩完庫藏及烟薰噎塞一切熱氣濕氣積鬱者，急宜服此方即

蘇

蘇

○骨蒸家宜隨證

服此

療瘧服如桂枝湯法，凡寒熱潮者治與瘧同

右側麻豆大每服四錢匕水盞半煮八分去

半滓溫服有微汗避風

以水一合五勺煮取六勺

病者一身盡疼發熱日晡所劇者名風濕此

病傷於汗出當風或久取冷感致也平半

牡蠣湯三治麻黃甘州湯症而胸腹有動

牡蠣蜀漆

麻者西牡蠣麻黃各四兩

錢一甘草二兩五分蜀

漆三兩

七分五厘

右四味以水八升先煮蜀

漆麻黃去上沫得六升內諸藥煮取二升溫

服一升若吐則勿更服

以水二合四勺先煮麻黃蜀漆得一合八

勺內二味

○治牡瘧

四升以水八升煮取

麻黃淳酒湯

治喘而發黃或身疼者

內五錢

麻黃三兩

錢三黃甘州黃武而煎取

汁

右味以美清酒五升

二勺合煮取二升半

頓服盡冬月用酒春月用水煮之

○治黃疸

半夏麻黃丸

治喘而嘔

半者

正

半夏麻黃各等分

四錢以水五升煮取六升

與麻同

東洞子曰當有

喘症

或為兼用可也

胃氣直刺

有驚怖而悸者

宜兼用劑

宜兼用劑

宜兼用劑

。我喉家要方

虞夏問  
衣端而亦  
也  
對入錄人  
以不十  
及本大  
○

右三味末之煉蜜和丸小豆大飲服三九日

三○心下悸者厚淡而熾出頭

小青龍湯治咳五味細辛黃上循桂枝頭痛發熱

惡風桂枝或乾嘔半夏乾姜者厚淡發熱而

麻黃芍藥乾姜甘草桂枝細辛各三兩三五

味子半夏各半六分野不味心頭

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥煮取三升去滓溫服一升以水二合煮取六勺

○加減法總無驗  
及本文或渴或利  
以下十七字共是  
後人攙入也又曰  
此方加石蜜治本  
方証而有心下水  
氣或渴者

○加減法總無驗

加減法若微利者去麻黃加薤白如雞子若  
渴者去半夏加栝蒌根三兩若噎者去麻黃  
加附子一枚若小便不利小腹滿去麻黃加  
茯苓四兩若喘者去麻黃加杏仁半升三五  
傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而咳或  
小便不利或噎或小便不利小腹滿或喘者  
傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯  
已渴者此寒去欲解也○病溢飲者當發其



○二方皆主溢飲  
而有煩渴者大青  
龍湯效甚者小青  
龍湯

○東師子曰當宜

天青龍湯吐逆之小青龍湯亦與之吐逆效逆  
倚莫不得胃手青龍湯吐逆之青龍湯吐逆珍  
唾吐燥寸脈沉尺脈微手足厥逆氣夜斗腹  
正衝胸咽手足痺其面翕然如醉狀因復下  
流陰股小便難時復胃者與桂枝枝五味  
神草湯陷其氣衝也婦人吐涎沫醫反下之  
心下節痞當先治其吐涎沫青龍湯主之  
大涎沫止乃治痞瀉心湯主之孫貴杏汁散治增水

東桐子曰當有  
頌馮証

大青龍湯

治喘

杏仁  
麻黃

及欬嗽

杏仁  
麻黃

渴欲飲水

石上術

桂枝

或身痛

麻黃  
大聚

惡風

桂枝  
麻黃

者

麻黃六兩

桂枝

甘草

各二兩

杏仁四十個

鮮薑

二兩

枳實

各四分

雞

子

一錢

其面食然必酒也因其

治七疔以本在升先煮麻黃減再升去上沫

都諸藥者取三升去滓溫服青升取微似汗

汗出多者溫粉粉之青服汗者俟後服汗多

○二卷皆主益道

之不識者非此自

上辨脈學多未主

醫者若而不知辨

東洞子曰厥逆

筋惕肉瞤直武湯

證可考

。脈微弱以下恐

非長沙家法當不

拘焉近方家怯癘

蓋因是而生

。傷寒脈浮緩條

豈必為小青龍湯

證乎

亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也以水一合

但太陽中風脈浮發熱惡寒身疼痛不汗出

而煩躁者大青龍湯主之若脈微弱汗出惡

風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆

也①傷寒脈浮緩身不疼但重者有輕時無

少陰證者大青龍湯發之後條辨續論皆云當是小青龍湯證

之今從①病益飲者當發其汗大青龍湯主之

文小青龍湯亦主之而辨如杏干桑葉

通平

。近方川芎茶調

散証而煩渴者主

之因是而生

此證並古案却無

非是此案去當不

。相類錄以不察

諸

藏對肉腫而加甚

。東洞守曰大青

龍湯證而不咳嗽

上樹脚變急者上

之不渴當作渴自

汗出之下常有或無汗字

文蛤湯治煩渴

文蛤石膏

而喘咳

麻黃杏子

急者

文蛤石膏各五兩

七分五厘

麻黃甘草生姜各三

兩大棗十二枚

各四分五厘

杏仁五十個

五分

右七味以水六升煮取三升溫服百升汗出

即愈○吐後渴欲得水而貪飲者文蛤湯主

之兼注微風脈緊頭痛

越婢湯治大青龍湯證而不咳嗽

無上樹

者麻黃六兩

九分

石膏半斤

七錢 生姜三

○謹按水腫或脚  
疾者主之不拘渴  
與熱是以不與大  
青龍湯相類矣故  
曰不渴無大熱

○風風虛發卅

○加朮湯此方加  
附子名越婢加朮  
附湯本方證而有  
水氣者主之

兩四分

大棗十五枚六分甘草四分

右五味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥

煮取三升分溫三服

以水一斗風水惡

風無身悉腫脈浮不渴續自汗出無大熱

越婢加朮湯治本方証而小便不利者

於越婢湯方內加朮四兩甘草和黃芩各

令麻黃二分石膏八分大棗各四分甘草二分生姜

一分五分白味煮如本方小對不味

水處養生文

閉塞太甚而自

閉于氣動則爪木

爪木為此爪木

厲風氣後世名

腳痺風

曰下風天熱

東洞子曰當有

煩渴嘔逆證與大

氣去之不詳哉

難辨水動起輒

裏水者一身面目黃腫其脈沈小便不利故

令病水假如小便自利此亡津液故今瀉也

裏水越婢加朮湯主之甘草麻黃湯亦主

之治肉極熱則身體津脫蹇理開行太泄

厲風氣下魚腳弱不臥自汗出無大熱

越婢加半夏湯主之治本方證而嘔者風水惡

於越婢湯方內加半夏半升去上末內葶藶

兩麻黃半夏各六分石膏八兩生姜三分大棗四分甘

效而咽喉不利  
數問微喘不絕者  
此謂效而上氣

葛根劑三方痢  
家亦有川之疫痢  
其初一二日表熱  
甚者用葛根湯或  
加半夏服得汗即  
愈者不少也下汗  
止後服兼用三黃  
丸亦驚癇破傷風  
類諸搐搦及張角  
弓者主之桂枝加

外草射散之內右尖味煮如本方

效而吐氣此為肺脹其入喘而如脫狀脉浮

大者麻黃湯口禁不語舌干咽塞

葛根湯治項背強急葛根發熱枝惡風生或

喘麻黃或身疼麻黃者或干惡風太陽與

葛根四兩六分麻黃生薑各三兩大棗十二枚

各四分桂枝芍藥甘草各二兩三分諸息及禁

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減二

葛根湯括蕪桂枝湯類大同小異各宜隨証又治雁瘡及諸痛痒或無名者且標注所舉皆外證已外証雖則爾當主腹証此謂本末腹証本也外証末也萬萬咸同

○東洞子曰公病係病之說非疾醫事也

○氣水氣也

升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆

取微似汗不須斲爾餘如桂枝法將息及禁

忌以水二合煮取六勺椒黃主善各三兩大棗十二枚

太陽病項背強几丸無汗惡風○太陽與陽

明合病諸以自下利○太陽病無汗而小便

反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛瘕

葛根加半腹湯治本方證而嘔者半者非根也

於葛根湯方內加半腹半升本方



各節其猶

大柴陷葛皆同宜

好葛柴陷美甜葛

甜葛柴陷以林

葛柴陷走半夏

甜葛柴陷以葛

○東洞子曰當有項背強急心悸症

能解醒

大葛根半夏

各六分

桂枝芍藥甘草

各三分

麻黃

大棗姓緩

各四分

夏半代

六分

柴陷以味煮如本方參甘草生姜各三兩大

太陽與陽明合病不下利但嘔者

葛根黃連黃芩湯治項背強急根心悸連黃而

赤利者若而葛根半斤

一錢六分

甘州黃芩各

五兩四分黃連三兩

六分

下之味緩不立風外

若四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥

煮取再升去滓分溫再服

以水二合六分煮取六分

太陽病桂枝症醫反下之利遂不止脈促者

表未解也喘而汗出者

六一六分甘草黃芩各

小柴胡湯

黃芩治胸脇苦滿或寒熱往來

柴胡黃芩

或嘔生

半夏者合歲不味此藥

柴胡半斤八分黃芩二參甘草生薑各三兩大

棗十二枚

各三升半夏半升六分

右七味以水各代升二升煮取六升去滓再煎

消補類

○按心下痞鞅證

不可開

○治瘧服如桂枝

法也柴胡加芒消

湯柴胡去半夏加

枳實湯柴胡加桂

枝湯柴胡姜桂湯

大柴胡湯皆同宜

各隨其證

○加減法不足信

蘇頌黃芩附子

○根卧余者豈必

六字恐誤入

○趙氏中以此十

取三升溫服一升日三服後加減法若胸中  
煩而不嘔去半夏人參加栝蔞實三枚若渴  
者去半夏加入參合前成四兩半栝蔞根四  
兩若腹中痛者去黃芩加芍藥二兩若脇下  
痞鞭去大棗加牡蠣四兩若心下悸小便便不  
利者去黃芩加茯苓四兩若不渴外有微熱  
者去人參加桂三兩溫覆取微汗愈若欬者  
去人參大棗生姜加五味子半升乾姜二兩

以水合四勺煮取六勺正捨平半長棹姜二兩

傷寒六七日中風往來寒熱胸脇苦滿默默

不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴

或腹中痛或脇下痞鞭或言不悖小便不利

或不渴身有微熱或欬者也太陽病未以

去脈浮細而嗜卧者林因解也設將滿脇痛

者與小柴胡湯脈但浮者麻黃湯主之也而

弱氣盡滕理開邪氣因入與正氣相搏結於

○或胸中以下三十  
六字恐後入

○脈但浮者豈必  
為麻黃湯證乎

○城賦去不足計

○以法治之者蓋  
柴胡去半夏加枳  
萸湯

○傷寒四五日以  
下非小柴胡湯証  
柴胡薑桂湯証乎

脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不  
欲飲食藏府相連其痛必互邪高痛下故使  
嘔也○服柴胡湯已渴者屬陽明也○以法治  
之○得病六七日脈遲滑弱惡風寒手足溫  
醫五日下之不能食而脇下滿痛面目及身  
黃頸項強小便難者與柴胡湯後必下重本  
渴而飲水嘔者柴胡湯不中與也食穀者噦  
○傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手

柴胡證  
下非小柴胡證  
謝舉四年日

柴胡  
柴胡去半夏  
以我成之  
茶蓋

足溫而渴者○傷寒陽脉○濇陰脉○弦法當腹  
中急痛者先與小建中湯不差者○傷寒中  
風有柴胡證但見○證便是不必悉具○凡  
柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與  
柴胡湯必蒸蒸而振卻發熱汗出而解○大  
陽病過經未愈○但反二三下之後四五日柴  
胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急  
鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡下之則愈

限亦過結之去精  
對下以清其滯  
肅其半其半野之  
空請以以附固苦  
限半未半野豈別  
此亦寒以以附  
珠亦亦豈矣

○經水適斷者非  
婦人而何婦人  
字不可刪蓋筆受  
者然也且熱入血  
室者而以經水適  
斷其血必結此言  
大可疑又非柴胡  
證反是挑核承氣

④傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡夜發  
潮熱已而微利此亦柴胡証下之而不得利  
份反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱  
者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加  
桂枝湯主之○婦人中風七八日續得寒熱  
發作有時經水適斷者此為熱入血室其血  
必結故使如瘧狀發作者時時傷寒五諫曰  
頭汗出微惡寒手足冷心下滿自寒欲食大

湯證也。婦人傷寒寒熱  
得來經水適來者  
正是熱入血室證  
也。其血必結而如  
瘕狀。證言矣。語如  
有神聖者。宜用小  
柴胡湯。炮乾地黃  
紅花。尤効矣。

近方家但以脉  
別半表半裡證。此  
空論也。以胸脇苦  
滿為半表半裡之  
候。可也。若其微旨  
別有取診之法。詳

于夏診圖解

便鞅脉絀者。此為陽微結。必有表復者。裏也。  
脉沈亦在裏也。汗出為陽微假令純陰結不  
得復有外症悉入在裏。此為柴在裏空在外  
也。脉雖沈緊不得為少陰病。灰以然者。陰不  
得有汗。今頭汗出。故知非少陰也。河與小柴  
胡湯。設不汗者。得寐而解。傷寒五六日。但  
嘔而發熱者。柴胡湯症。俱而以他藥。不從柴  
胡證仍在者。復與柴胡湯。既雖已下。之不為



逆必蒸蒸而振，卻發熱，汗出而解。若心下滿而鞭痛者，此為結胸也。大陷胸湯主之。但滿而不痛者，此為痞。柴胡不中與之，宜半夏瀉心湯。陽明病發潮熱，大便溏，小便自可，胸脇滿不去者，陽明病，脇下鞭滿不去，大便而嘔，舌上白胎者，可與小柴胡湯。上焦得通，津液得下，胃氣因和，身濈然而汗出，解也。陽明中風，脈弦浮大而短氣，腹都滿，脇下及心

痛又按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥一身及  
面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫  
刺之小差外不解病過半日脈續浮者與小  
柴胡湯脈但浮無餘症者與麻黃湯若不尿  
腹滿如噦者不治○本太陽病不解轉入少  
陽者脇下鞅滿乾嘔不能食往來寒熱尚未  
吐下脈沈緊者○若已吐下發汗溫鍼譏語  
柴胡症罷此為壞病知犯何逆以法治之○

傷寒初服小柴胡湯差已後更發熱者病未盡也故再用小柴胡若其  
證變者或以汗或以下各隨其證凡  
差已後再發者皆  
此例也初服瀉心  
者再與瀉心初服  
承氣者再與承氣  
○產後三證所多  
有也各宜隨證治  
之豈獨小柴胡湯  
而已耶故東洞子  
刪之也  
者宜失  
暈絕者宜急刺其  
百會以取血  
產後四肢苦煩熱

嘔而發熱者○傷寒差已後更發熱者小柴  
柴胡湯主之脈浮者以汗解之脈沉實者以瀉  
解之○諸黃腹痛而嘔者○新產婦人有三  
病與者病瘕者病鬱胃也者大便難何謂  
也○白新產血虛多汗出喜中風故令病瘕  
血復津寒多故令鬱胃也津液胃燥故大便  
難產婦鬱胃其脈微弱不能食大便反堅但  
頭汗出以然者血虛而厥厥而必冒胃家

此轉變生虫也服

三物黃芩湯得虫

下乃愈產後諸疾

久久不差或至不

救者間有此證不

可不知也

直少谷宜黃芩

直少谷宜黃芩

直少谷宜黃芩

直少谷宜黃芩

直少谷宜黃芩

直少谷宜黃芩

直少谷宜黃芩

欲解必大汗出以血虛而厥孤陽上出故頭

汗出所以產婦喜汗出者凶陰血虛陽氣獨

盛故常深出陰陽乃復大便堅嘔不能食

婦人在州蓐自發露得風四肢若煩熱頭痛

者與小柴胡湯頭不痛但煩者三物黃芩湯

煎之○黃芩煎而刺者○條蠶入食三

柴胡加芒消湯治柴胡湯證而若滿難解

者而發於小柴胡湯方內加芒消六兩小柴

虛者小柴胡證不  
○ 賦下言証甚寒寒  
○ 賦卦卦對美卦  
○ 瘧疾及諸如瘧  
狀者且陽明病燥  
屎之外證或近方  
家稱勞證名無根  
火者皆是潮熱而  
實也非虛矣東洞  
子以為虛實弗可  
拘故於潮熱者實  
也○ 五音域焉而異  
之○ 然徐恐蒙士  
見此乃以潮熱為  
虛乎故云爾

柴胡柴胡

分八

半夏苈消

分各六

人參黃芩甘草生

姜大棗

分各三

分各三

右八味以水二合四勺煮取一合二勺去

滓再煎取六勺內苈消更上火微沸令消

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡更發潮

熱已而微利此本柴胡證下之而不得利今

柴反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者

實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加苈

消湯主之小柴胡湯以補心針以著胸吸

柴胡去半夏加枳萸湯治小柴胡湯證而渴

括不嘔去半夏者本柴胡證不嘔而不嘔者令

於小柴胡湯方內去半夏加枳萸根四兩

柴胡八分人參黃芩甘草生姜大棗各三分枳

萸根如木右七味煮如本方合二升

治瘧病發渴者亦治勞瘧

柴胡加桂枝湯夏治小柴胡湯與桂枝湯二方

東洞子曰當有胸脇苦滿證而身熱外微熱者實下以益氣實其下實也非氣笑東師火者皆是厥熱而索解熱證各辨財氣之代證也並大桂枝且謂脾虛穀難養又治吐酸

加桂枝湯姜桂湯下言証甚寥寥須於小柴胡湯下求之其他主症亦歷觀類方相通用則有益甚多猶白虎湯主症在白

虎加入參湯下夫加桂枝湯者日用佳方如家常茶飯且其功多矣由按經  
曰主小柴胡湯者  
而服此方則其功  
勝小柴胡湯者至  
多可以不思哉

今蒸味甘苦煎

證

曰常自閉証亦便  
出者其辨證也又  
東國子曰煎下

中龍言者也

證相合者（一）黃連桂枝黃芩人參芍藥生姜各

兩兩半大棗六枚（二）三月草兩兩（三）半夏三

合半（四）柴胡四兩（五）長煮取六升去滓再煎

右丸味以水柒升煮取三升去滓溫服一升

柴胡服（六）今蒸如小柴胡湯（七）柴胡湯（八）柴胡湯（九）柴胡湯（十）

傷寒如七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心

柴下支（十一）證未去者（十二）發汗多（十三）陽識證者（十四）

不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛以通津液（十五）

中猶言傷也

○東洞子曰頭汗出者是衝逆也又曰當有胸脇有動證

○今煮如小柴胡

湯也小柴胡

而服此也四日

日主坏柴胡高

氣賦入者高先夫賦針

後自愈○心腹卒中痛者其柴胡以煎

柴胡姜桂湯治小柴胡湯證而不嘔去半渴

括藜而腹中有動括上衝括者括與

柴胡半斤括桂枝乾姜黃芩牡蠣各三兩分

括藜根四兩分甘草二兩分去氣

右七味以水一斗分外煮取六升去滓再煎

取四升溫服六分分外初服微煩復服汗

出便愈○傷寒五六日分已發汗而復下之胸



一衣以不并大

魂三衣三宅夕日

王函聖再厥直

日本六堂在大是

寧已不業上又

胸腹動證

胸腹動證

此方主又手冒心

等升陽散火湯證

而煩躁上逆胸腹

有動者與桂枝加

龍骨牡蠣湯同然

此方至若滿是為

小異耳少腹不安

胸滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往

來寒熱心煩者此為未解也○盧寒多微有

熱或但寒不熱者○藥短即上黃甘

柴胡加龍骨牡蠣湯世煥案治小柴胡湯證而

胸牡腹有動龍骨心下悸茯苓煩驚丹上逆桂枝

者寒人半夏二合四分大棗六枚生姜人參龍

骨鈎丹桂枝茯苓牡蠣各兩半各二分柴

胡四兩五分大黃二兩四分內大黃四分

驚刺或心氣不定者主之

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

右十兩味以水八升煮取四升內大黃切如

棊子更煮六升沸去滓溫服六升二里

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利讖語

一身盡重不可轉側者大黃

大柴胡湯治小柴胡湯證而心下痞硬

參腹滿枳實拘攣芍藥或嘔生薑者人黃

柴胡半斤八黃芩芍藥各三兩大棗十二枚

各三半夏半升六生薑五兩枳實四枚各五

金匱要略有大黃  
二兩右七味作右  
八味 煎散自下  
飲食相共中候之  
功言謂不惟此下  
而占上節數生謂  
○純以小二茶高  
野白煎此非好藥  
神之又曰煎好下  
煎入參煎好下  
煎薑文始於外自  
曰以上三章非自  
白煎薑東歸子

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎  
溫服一升日三服一方用大黃二兩二分若不

加大黃恐不為大柴胡湯也

煮如小柴胡湯兩二味

白太陽病過經十餘日反二三下之後四五日

柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下

急鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡湯下之

則愈○傷寒十餘日熱結在裡復往來寒熱

者與大柴胡湯但結胸無大熱者此為水結

○白虎湯東洞子  
 曰以上三章非白  
 虎湯之証乃於白  
 虎加人參湯條下  
 辨之。又曰煎法可  
 從白虎加桂枝湯  
 ○按口不仁者渴  
 而舌上乾燥生胎  
 故言語不利且不  
 知食味是也加之  
 以繼語遺尿自汗  
 身重乃白虎証也  
 明矣為非白虎証  
 者余未得其說  
 診脈以決白虎証  
 者不可不知按脈

在胸膈也。但頭微汗出者大陷胸湯主之。○  
 傷寒發熱汗出不解心下痞鞅嘔吐而下利  
 者○按之心下滿痛者此為實也。當下之。○  
 傷寒後脈沉沉者內實也。下解之。○  
 白虎湯治大渴引飲石膏煩燥知母者粳米  
 知母六兩分六石膏半斤分六甘草二兩分二粳  
 米六合分錢三服一食用大黃二兩分錢米不  
 右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一

者不可不知按脈稍久稍用力而指頭熱者是裏熱也。白虎類與五苓

散亦互有相救之勢。審証先與白虎湯而難愈者，與五苓乃愈。些飲得除心下開爽而白虎之功見也。余知之者曰：服文蛤散若不差者，與五苓散。又文蛤散與五苓散相表裡也。文蛤但治渴，故準擬以知白虎與五苓相救也。治驗亦多。

東洞子曰：白虎湯症而心下痞鞅者，主之又若渴欲飲水，口乾舌燥，條白為則，揆以上門。

白升日三服，以水煎服六分。合氣散而土樹地昔。

傷寒脈浮滑，此表有熱裏有寒。○三陽合病

腹滿身重，難以轉側，只不仁而面垢，讖語遺

尿發汗則譫語，以水煎服六分。之則額上生汗，手足逆冷

若自汗出者。○傷寒脈滑而厥者，裏有熱也。

白虎加入參湯。治本方證而心下痞鞅。人參者

於白虎湯方內加入參三兩。五分。土氣熱而取

服桂枝湯，大汗出後大煩渴不解，脈洪大者。

章千金方作白虎湯去之外臺亦用而方後曰傷寒論本今從之不誤

東岡子曰白虎

亦矣

正其陽氣也

華辨曰味自氣也

炎暑中昏暴吐瀉

惡風汗出而渴此

為陽病

治中自霍亂或

四肢厥冷者又治

瘧疾服如桂枝湯法

○傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在

裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩

欲飲水數升者○傷寒無大熱口燥渴心煩

背微惡寒者○傷寒脈浮發熱無汗其表不

解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者○

若渴欲飲水以乾舌燥者○太陽中熱者喝

是惡汗出惡寒身熱而渴○三陽合病

白虎加桂枝湯治白虎湯證而上衝桂枝者

瘧疾服如桂枝湯法加人參湯加桂枝湯皆同

於白虎湯方內加桂枝三兩三分

右以水一斗五升煮取八升去滓溫服○溫  
瘧者其脉如平身無寒但熱骨節疼煩時嘔

類聚方集覽上

賤粟古集賢士

蘇昔其祖也平其無寒卧蘇骨翁蘇歐邦國  
古以水一卡正水蘇双八卡志率盛照○盛  
外自武愚古内叭卦林三兩<sub>上分</sub>  
三



干絲外煎餅

○小野都茶蒲丸

附

半日餅餅亦同餅

餅亦餅餅餅餅餅

○大野都茶蒲丸

○大野都茶蒲丸

○更衣謂大便下

也

○大野都茶蒲丸

類聚方集覽下裏四毒表少當飛雙刊菜煎麻

大珀本下日南總在燕雞間煥子炳標注野

小承氣湯治腹滿而大便難大者下與

小承氣湯治腹滿而大便難大者下與

大黃四兩一分厚朴二兩枳實六分枳實六分

已上三味以水四升煮取一升二合去滓分

溫三服以水二合初服湯當更衣不爾者盡

飲之若更衣者勿服之惡寒者其良心重

○病後及平日頻  
放屁者宜此方

○夏冬體大壯

○大滿不通者宜  
主大承氣湯外症  
雖有微發熱惡寒  
半已稱微亦何拘  
拘  
○小便清者說見  
干桂枝湯標

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短  
氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也  
手足濈然而汗出者此大便秘也大承氣  
湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其  
小熱不潮不可與承氣湯若大滿不通者可與  
小承氣湯微和胃氣勿令大泄下○傷寒不  
大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便  
濇清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛

○失氣當作矢氣  
轉訛也。矢與屎通。  
轉矢氣謂放屁。夫  
欲用大承氣者先  
與小承氣而以轉  
失氣為其候者此  
或不然。且曰攻之  
必脹滿者亦不足  
信之。若用大承氣  
有<sub>此</sub>天害者雖小承  
氣不當用之。此摸  
索以冀有<sub>此</sub>調中者  
已蓋僥入也。明矣。  
要之嘗一誤藥而  
怯癘為<sub>此</sub>痼者之言。

者必<sub>此</sub>衄。宜桂枝湯。○陽明病潮熱大便微鞅  
者可與大承氣湯。不鞅者不與之。若不<sub>此</sub>大便  
六七日恐有燥屎欲知之。法少與小承氣湯  
湯入腹中轉失氣者此有燥屎乃可攻之。若  
不轉失氣者此但初頭鞅後必澹不可攻之。  
攻之必脹滿不能食也。欲飲水者與水則噦。  
其後發熱者必大便復鞅而少也。以小承氣  
湯投之不轉失氣者慎不可攻也。○陽明病

也非長沙家法且  
診燥屎之法詳于

大承氣標

畢竟大小承氣湯

方本同証也若去

消石若壁之鈍刀

遂弗可用已若以

大承氣湯為不可

則當按他方用之

不可忽諸

大承氣湯

大承氣湯

大承氣湯

大承氣湯

大承氣湯

其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞫鞫  
則譫語小承氣湯主之若不服譫語止更莫  
復服○陽明病譫語發潮熱脉滑而疾者小  
承氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉失氣  
者更服一升若不轉失氣勿更與之明日不  
大便脉反微澁者裏虛也為難治不可更與  
承氣湯也○太陽病若吐若下若發汗微煩  
小便數大便因鞫者與小承氣湯和之愈○

○下利讖語者有燥屎是也。承氣湯症。

○長沙氏有「小承氣湯」我未能信之。

得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下

鞭至四五日雖能食以小承氣湯少少與微

和之令小安至六日與承氣湯一升若不

大便六七日小便少者雖不能食但初頭鞭後

必澹未定成鞭攻之必澹須小便利屎定鞭

乃可攻之宜大承氣湯○下利讖語者有燥

屎也○大便不通噦數讖語者一卡二代夫

厚朴三物湯治小承氣湯證而腹滿甚厚朴

枳實

而况於厚朴三物湯乎

○可味類聚首序

○東洞子曰此方合厚朴三物湯與挂枝去芍藥湯而加生姜二兩方也由是觀之當有二方證而上逆嘔証

加倍者厚朴八兩二錢 大黃四兩二錢 枳實五枚五分

實五枚五分 右三味以水一斗二升先

煮二味取五升內大黃煮取三升溫服一升

以利為度煮如 痛而閉者小別味氣安

厚朴七物湯小治腹滿枳實 發熱挂枝 上逆挂枝

而嘔生者 至六日與承原湯大

厚朴半斤八分 甘艸大黃各三兩三分 大棗十枚

枳實五枚五分 生姜五兩各五分 挂枝二兩二分

○治後世稱膨脹者又大黃合桂枝合芎藭能治衝逆

○按或以甘州湯為後方可也此長裏相救也曰陽明病不吐不下心煩者調胃承氣湯主之此是知之

右七味以水一斗煮取四升溫服八合日三

服

以水一合五勺煎取六勺

嘔者加半夏五合下利去大

黃寒多者加生姜至半斤

病腹滿發熱十日脈浮而數飲如故

大承氣湯

治腹堅滿

厚朴芒消枳實

若下利臭穢

若燥屎

大黃芒消

者凡有燥屎者臍下必磊

砒也肌膚必枯燥也煥曰以手按腹病人兩

手護之眉皺作楚是也

蒿麥煎法蒿麥擇

為麤末加鹽炒熱

入囊以摩腹上能

令藥力透

對藥以甘枳

對藥以甘枳

對藥以甘枳

大黃四兩六分厚朴半斤二錢枳實五枚七分五厘

芫消三合九分蘇欬也欬日八升蘇欬八兩

右四味以水一斗先煮芫消五升去滓內

大黃煮取三升去滓內芫消五升上火微一兩

沸分溫再服得下餘勿服以水三合煮厚朴枳實減半去滓內

大黃煮取六分內芫消令消蘇欬半斤

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短

氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也



不讀書目不辨財豈小黃四奴財令六神皆無以去過頭蘇入兩手  
商考六日以考口  
醫宗必錄六台

不下夫矣

平結矣此身其結

。所謂治有汗吐  
下和之四者蓋本  
于茲

宜與小承氣湯標  
併觀上條同

手足澀然而汗出者此大便秘也。大承氣  
湯主之。若汗多微發熱惡寒者外未解也。其  
熱不潮未利與承氣湯。若腹大滿不通者可  
與小承氣湯。微利胃氣勿令大泄。下利瀉即  
病。潮熱大便秘者。可與大承氣湯。不瀉者  
不與之。若不大便六七日恐有燥屎欲知之  
法。少與小承氣湯。湯入腹中轉失氣者。此有  
燥屎乃可攻之。若不轉失氣者。此但初頭鞫

得勝上論同  
宜與小承氣湯

干甚  
不味之四者蓋本  
○傷寒有燥屎者  
外証多如是其機  
不可失矣

○醫宗必讀云治  
傷寒九日以來口  
不能言目不能視體  
不能動四肢俱冷六  
脉皆無以手按腹  
病人兩手

後必澹不可攻之攻之必脹滿不能食也欲  
飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞭  
而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不  
可攻也○傷寒若吐若下後不解不大便五  
六日土至十餘日日晡必發潮熱不惡寒獨  
語如見鬼狀若劇者發則不知脈循衣摸床  
惕而不安微喘直視脉弦者生澹者死微者  
但發熱譫語者大承氣湯主之若下服利止

護之眉揪作楚跌陽脉大而有力量乃知腹有燥屎也遂下之得燥屎六七枚而口能言體能動矣

蘇并并麻黃各半  
○此非蘇并麻黃也

後服○陽明病譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞞爾○汗出譫語者以有燥屎在胃中此為風也須下之過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裡實故也下之則愈○宣陽併病太陽證罷但發潮熱手足絳絳汗出大便難而譫語者下之則愈○陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞞後必

○此非挂枝湯証  
恐挂枝麻黃各半湯

澹不可攻之若有燥屎者○病人煩熱汗出  
則解又如癰狀日晡必發熱者屬陽明也脉  
實者宜下之脉浮虛者宜發汗下之與大承  
氣湯發汗宜挂枝湯○大下後六七日不大  
便煩不解腹滿痛者此有燥屎也○以然者  
本有宿食故也○病人小便不利大便乍難  
乍易時有微熱喘冒不能卧者有燥屎也○  
得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩燥心下

虛矣  
然而口消言譫

不發矣

不盡藥心守下

火為內傷又藉之

疎吹火也下望之

表裏熱也對眼夫

見少則厥莫然也

急多則漸藥亦以

其未失方以處則

難下時未安外具

以不許蓋其饋姑

折留本欲不原姑

。但發熱汗多者

不可妄攻之詩云

戰戰兢兢如臨深

淵如踏薄冰此之

鞭至四五日雖能食以小承氣湯少少與微

和之令小安至六日與承氣湯一升若不

便六七日小便少者雖不能食但初頭鞭後

必澹未定成鞭攻之必澹須小便判戾定鞭

乃可攻之○傷寒六七日目中不了了睛不

和無表裏證大便難身微熱者此為實急下

之○陽明發熱汗多者急下之○發汗不解

腹滿痛者急下之○腹滿不減減不足言當

謂也下條口燥咽乾者亦同焉然大承氣湯証而急下者急下之可也

世醫本恐下劑故以不得盡其劑故雖下利未爽快見其未爽快以為既虛妄與補藥亦何愚也除病莫如盡未盡無止後服夫病如火也下星之火咸陽為灰毒之不盡雖少乎不可不除矣

下之○陽明少陽合病必下利其脉不負者

順也負者失也互相尅賊名為負也脉滑而

數者有宿食也當下之○少陰病得之二三

日口燥咽乾者急下之○少陰病自利清水

色純青心下必痛口乾燥者急下之○少陰

病六七日腹脹不大便者急下之○下利三

部脉皆平按之心下鞭者急下之○下利脉

遲而滑者內實也利未欲止當下之○入病

○中風卒倒有因食噉太過者此曰食厥此方主之

有宿食何以別之曰寸口脈浮而大按之反

澁尺中亦微而澁故知有宿食當下之○下

利不欲食者以有宿食故也當下之○下利

差後至其年月且復發者以病不盡故也當

下之○下利脈反滑當有所去下之乃愈○

病腹中滿痛者此為實也當下之○脈雙弦

而遲者必心下鞅脈大而緊者陽中有陰也

可以下之○瘕為病胸滿口噤臥不著席腳

○差後至其年月日時復發者何必下利乎諸病或有一例宜深思之初服承氣湯病解能食後更發熱者病未盡故也更與承氣小柴胡湯條有此例宜併觀之

惡露不盡非產後而何。剛產後字者記者訛也。且惡桃仁承氣湯証。

東洞子曰當有心悸証。

以下三方善用之。應變奏功不可勝計矣。風小煩悸手足痺曳惡對久厥。

煩驚面色時時變志氣恍惚積熱蒸面及狂疾諸病驚風疴癇等。要謂於

攣急必齧齒。病解能食七八日更發熱。此

為胃實。產後七八日無太陽證少腹堅痛。

此惡露不盡不大便煩燥發熱切脈微實再

倍發熱日晡時煩躁者不食食則讖語至夜

即愈宜大承氣湯主之。熱在裏結在膀胱也。

大黃黃連瀉心湯。治心煩。黃連大黃心下痞按之

滿。黃連大黃者。煎而大黃二兩。黃連一兩。錢一

石二味以麻沸湯三升漬之。須臾絞去滓分



癰痲者或酒毒傷食或眼生翳障赤澀流淚或諸麻帶下又諸血症心煩  
者諸心腹卒痛皆  
主之

。東洞子曰煎法  
當從大黃黃連瀉  
心湯附子瀉心湯  
之法也又曰不足  
千金作不定今從  
之

溫再服

以麻沸湯八勺內藥  
沸須臾絞去滓溫服

黃芩之飛與蘇

心下痞按之濡其脈關上浮者○傷寒大下

後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻

痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯

攻痞宜大黃黃連瀉心湯

瀉心湯正治心氣不定

黃連  
黃芩

心下痞按之濡

黃芩  
大黃

者大黃二兩

錢一  
黃連黃芩各七兩  
分五

右三味以水五升煮取三升頓服之

千金方下式今  
○總與上方同而  
此方為勝  
有奇効金瘡並血淋  
○東國子口煎去

心氣不足吐血衄血○本以下之故心下痞

與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不

利者五苓散主之○婦人吐涎沫醫反下之

心下即痞當先治其吐涎沫小青龍湯主之

涎沫止乃治痞瀉心湯主之○桂枝湯

附子瀉心湯○治瀉心湯證而惡寒附者已文

於瀉心湯方內加附子主救急○附寒大下

右四味切參味以麻沸湯二升漬之須臾絞

汁服之

聖水... 蓋轉端

去滓內附子汁分溫再服

大黃 錢 黃芩 黃連 各五分 附子 七分 其血當

大右四味以水九勺先煮附子取六勺去滓

內諸藥煮一二沸須臾絞去滓服

大心下痞而復惡寒汗出者 附子 細辛者

大黃附子湯治腹絞痛 附子 惡寒 附子 細辛者

大黃二兩 九分 附子二枚 一錢三分 細辛二兩 六分

右三味以水五升煮取二升分溫三服若強

胸膈腹偏苦滿  
腹絞痛至甚身不  
可轉側肉甲如磬  
坐卧兩不得者治  
之如神又曰承氣  
漿胡類以此方為

後方或長服承氣

柴胡類之人一日

開服此方而用前

藥乃奏功于倍也

此寒也者謂水

氣惡寒即水氣故

附子治之又細辛

治之

六黃甘遂湯腹

人煮取二升半分溫三服服後如人行四五

里進一服以水一合五勺煮取六勺脇下偏痛發熱其

大脉緊弦此寒也以溫藥下之

大黃甘遂湯治腹滿如敦狀大黃小便微難

甜或經水不調者

大黃四兩一錢四分甘遂阿膠各二兩七分

右三味以水三升煮取一升頓服之其血當

下以水一合八勺煮取六勺

經水不調則婦人字不可刪也蓋轉訛

治諸打撲要劑也。或為末石所壓，或從高墜若劇則瘀血上攻心腹實痛，膨脹悶亂，二便不通，或厥冷垂成者，並主之。金匱云：亦治男子膀胱滿急，有瘀血者，蓋此類乎。破傷風者服之，且

婦人小腹滿如敦狀，小便微難而不渴，生後此為水與血俱結在血室也。

抵當湯治瘀血凡有瘀血者，二少腹鞭滿，小便快利者一也，腹不滿其人言我滿者二也。煥案健忘者亦有瘀血，急則以湯，緩則以丸。水蛭、蝻蟲各三十個，耐桃仁二十個，分大黃三兩，錢右四味為末，以水五升煮取三升，去滓溫服一升，不下再服。為末以水一合煮取六分

傳瘡口有効又竹  
木刺在肉中者和  
飯附瘡口即挺出  
又眼目赤疼流淚  
痛不可忍者洗之  
最妙

。尿雖鞭云云是  
患血症之人

太陽病六七日表證仍在脉微而沈反不結

胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小

便自利者下血乃愈所以然者以大陽隨經

瘀熱在裏故也○太陽病身黃脉沉結少腹

鞭小便不利者為無血也小便自利其人如

狂者血證諦也○陽明證其人喜忘者必有

畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘尿雖

鞭大便反易其色必黑○病人無表裏證發

○為丸主治與浮

石丸同

東洞子曰治病不

別男子婦人雖然

則然乎心下痞按

之濡與腹不滿其

人言我滿者於症

則同於方則異男

子必三黃丸婦人

乃浮石丸抵當丸

豈必為無異乎

○晬時周時也

陰症傷寒有熱小

腹滿應小便不利

熱七八日雖脉浮數者可下之假令已下脉

數不解合熱則消穀善饑至六七日不大便

者有瘀血○婦人經水不利下

抵當丸治抵當湯症而緩者

六錢

水蛭蚘蟲桃仁各二十個大黃三兩

右四味杵分為四丸以水一升丸煮一九取

七合六服之晬時當下血若不下者更服○

者反利者宜兼用  
此方或單用更無  
餘藥可救其死者  
傷寒二字緊要也  
不可刪

橘皮大黃朴消  
湯中諸魚毒者皆  
主之又總治宿食  
在心胸間而不化  
不限魚毒魚毒久  
而為癥病者以苦  
酒飲漿水煮服妙  
○大黃消石湯當  
有心煩症治噎噤  
又平日懊懣者主之或為丸為兼用劑亦可也

有血也當下之不可餘藥

橘皮大黃朴消湯 治胸間有宿滯橘皮甚消而結

大者未橘皮一兩分六大黃朴消各二兩一分

右三味以水一大升煮至小升頓服即消以水

一合八勺○鱸食之在心胸間不化吐復

不出速下除之久為癥病

大黃消石湯 治發黃黃藥腹中有結塊大黃消石

者小大黃黃蘗消石各四兩八分梔子十五枚



新藥益壽  
金匱要略大醫方論卷之九

分四黃右四味以水六升煮取三升去滓內消

者並時

東洞子曰千金

黃芩黃連

黃芩黃連

黃芩黃連

黃芩黃連

黃芩黃連

黃芩黃連

黃芩黃連

黃芩黃連

黃芩黃連

分四黃右四味以水六升煮取三升去滓內消

大石更煮取一升頓服以水五合去滓內消

黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此為表和

裏實當下之音煎未效下下之當食血和共

大黃牡丹皮湯治臍下有堅塊大黃按之則

痛瓜子及便膿血挑按者芒消

大黃四兩六分牡丹皮一分挑仁五十個芒

消三合各三分瓜子半升一錢五分

奇術也便毒腸癰  
共不可論膿成與

未成

此方不獨治腸癰

而已專能治無名

惡瘡癰疔腫塊瘰

瘰流注楊梅便毒

及一切有膿者及

淋疾帶下痔漏痢

疾等雖及數年者

皆有奇功

。東洞子曰當有

急迫証

治心腹虫痛加鷓

鴒菜益奇

吐食或因大便秘閉

故用大黃

右五味以水六升煮取一升去滓內芒消再

煎沸頓服之有膿當下如無膿當下血以水

六勺煮取六勺法去滓內芒消令消消腸癰者小腹腫痞按之

大即痛如淋小便自調時時發熱自汗出復惡

寒其脉遲緊者膿未成可下之當有血脉洪

數者膿已成不可下也赤白汗出黃赤味

大黃甘州湯一治秘閉大黃急迫甘州者內消令消

大黃四兩錢甘州二兩分煎取三升去滓內煎

吐食或因大便秘閉故用大黃

蓋蓋紙... 胃中... 不... 口... 盡夫...

東洞子曰但拘急而大便不通者主之實者謂堅實有塊也凡噦逆家之要妙也

調胃承氣湯治大黃甘艸湯證而實消者

大黃四兩錢甘艸二兩五分芒消半觔二錢

右三味咬咀以水三升煮取一升去滓內芒

消更上火微煮令沸少少溫服以水一合八勺煮取六勺

去滓內芒消令消

傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒腳攣

此症而用桂枝湯，非醫人哉？為誤者，昭昭然，曰得之便，厥其然。

○一切牙齒疼痛者，加黃連，服之大，有奇効。及小兒疳蟲蝕齒，或至色黑者，亦加黃連用之。不早治之，循至朽盡。夫世醫門一切口病，多因胃熱者，不可謂無也。調胃者，蓋疏滌胃中熱毒之謂乎。病人面熱，亦胃熱也。宜此方加黃連，亦可也。芩、甘、姜、味、辛、夏、仁。

急反與桂枝湯，欲攻其表，此誤也。得之便，厥  
咽中乾，煩躁吐逆者，作甘、艸、乾、姜湯，與之，以  
復其陽。若厥愈足溫者，更作芍藥、甘、艸湯，與  
之。其脚即伸。若胃氣不和，譫語者，少與調胃  
承氣湯。若重發汗，復加燒鍼者，四逆湯主之。  
○發汗後惡寒者，虛故也。不惡寒但熱者，實  
也。當和胃氣。○太陽病未解，陰陽脈俱停，必  
先振慄，汗出而解。但陽脈微者，先汗出而解。

黃湯條有微宜併觀子亦宜此文。蓋對百寒莫脈外此云之脈證善合

脈寒下對寒血紫

赤白帶下主之並

耳

小頭發實而直寒

皆二便澀重並吐

○陽明病不吐不

下心煩譫語燥屎

等傷寒用此方之

樞要也但曰大黃

甘艸湯証而實者

於是後生或惑故

云爾

又主痢疾

但陰脈微者下之而解若欲下之○傷寒前

三日不解過經譫語者以有熱也當以湯下

之若小便利者大便當鞫而反下利脈調和

者知醫以丸藥下之非其治也若自下利者

脈當微厥今反和者此為內實也○太陽病

過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便

反澹腹微滿鬱鬱微煩死此特自極吐下者

與調胃承氣湯若不爾者不可與但欲嘔胸

○日數固，或不拘，然太陽病三日者，但變為陽明病之稱也。故曰屬胃也。不然，則但有桂枝證。證○小腹急結者，有二焉。一則帶急迫者，二則無逼迫，但小腹結實而有塊耳。赤白帶下，主之並痢疾打撲瘀血者，小腹急結有塊者，男子亦宜此方。

中痛微澹者，此非柴胡證，以嘔故知。極吐下

也。○陽明病，不吐不下，心煩者。○太陽病三

日，發汗不解，蒸蒸發熱者，屬胃也。○傷寒吐

後腹脹滿者。○大便不通，胃氣不和者。

挑核承氣湯。○治血證。挑核○小腹急結。大黃芒消

衝桂枝者，更休挑仁五十個，桂枝、芒消、甘草各

二兩。各五分○大黃四兩。錢○芒消五分○甘草五分

右五味以水七升，煮取三升半，去滓，內芒消

於此方之神焉。善會

此術則產論及其它方法皆可以覆醫執，催生亦至妙。又經水之變皆

去之

不伴茶

苦酒蒸服亦驗水

一和土山射以

其內吳茱萸煎

蘇合煎血脈諸

。乾血菴臍下故

其痛不可忍是以

稱毒痛又因經水

之變

治打撲功次于抵

當湯凡攻瘀血劑

更上火微沸下火先食溫服五合日三服當

微利以水一合五勺煮取六勺去滓內芒消微沸令消

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下

土者愈其外不解者尚未可攻當先解外外解

已但小腹急結乃可攻之

下瘀血湯治臍下毒痛桃核廣虫及經水不利大黃

廣者大黃二兩四錢桃仁廣虫各二十枚

右三味末之煉蜜和為四丸以酒一升煎一

皆治打撲，瘀血。  
若無廣蟲以畜與

代之。

解氣。人因發水  
其麻不下。以  
。并血者不。不效。

桂合破血劑能助  
其功是治衝逆之  
餘力也。

○一味土瓜根以  
苦酒煮服，治經水  
不利者。

陰癩腫者陰囊腫

大及陰莖腫脹或水疱光澤是也小兒亦同

丸取八合頓服之新血下如豚肝以酒八勺

六○產婦腹痛法當以枳實芍藥散假令不

愈者此為腹中有乾血著臍下宜下瘀血湯

主之亦主經水不利

土瓜根散治少腹拘急芍藥經水不利

或下白物廣者

芍藥桂枝廣蟲土瓜根各三分

右四味杵為散酒服方寸匕日三服



二... 婦得熱者其經閉... 帶下經水不利少腹滿痛經一月再見者大

秦寒熱血而急血

東阿子曰黃芩

一本治下有病

字。東阿子曰甘

州主急迫也

甘州湯五苓散二

方善知運用之妙

則與諸方相表裡

而有再快功也

東阿子曰枯痰  
如膿者主之

帶下經水不利少腹滿痛經一月再見者大

排陰癰腫

或熱血

及諸疾

主姜  
急血  
大棗  
甘代  
香

甘州湯

治逼迫及咽喉急痛者

甘州二兩

錢二 煎取一升半 去滓溫服七

右一味以水三升 煮取一升半 去滓溫服七

合日二服

以水一合

少陰病 欲吐咽

痛者可與甘州湯不差者與桔梗湯

桔梗湯

治甘草湯證而有膿或枯痰者

按金匱再服下有  
則排膿血也五字

而再再對也  
限與雷文附弄野  
衣蓋賦數因之然  
甘州藥正茶第  
轉主多也  
○東洞子曰  
一本  
○東洞子曰有粘  
痰或膿血而急迫  
者主之  
按排膿散排膿湯  
二方排膿字足以知其主治故略其症乎又桔梗湯下效而胸滿振寒

桔梗

一兩

錢

甘州

二兩

錢

右二味以水三升煮取一升去滓分溫再服

以水一合八少陰病二三日咽痛者可與  
勺煮取六分

甘州湯不差者○效而胸滿振寒脉數咽乾  
不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者為

甘肺癰

治膿血

排膿湯

治膿血

梗及粘痰

桔梗  
生姜

急迫

甘州  
大棗

甘州

二兩

錢

桔梗

三兩  
生薑  
一兩  
大

條即排膿湯症也用之大腸結梗湯治水滯而愈而愈也曰此為留滯結去  
除而頭空效驗真  
必不熱望諸茶下  
衣主水蘇曰疑傳  
熱升當首野遠也  
必姑當首野遠也  
凡腹弦急按之  
不燒者主之也藥  
治腹痛雖然亦宜  
因其腹症

○見于調胃承氣  
湯標

棗子枚

錢

水二右四味以水三升煮取一升

溫服五合日再服

以水一合

煮取六分

芍藥甘草湯

治拘攣

芍藥

急迫者十二分

甘草藥甘草各四兩

錢

芍藥各四兩而心下轉筋

右三味以水三升煮取一升半去滓分

溫再服之

以水一合二升

煮取六分 藥諸皆火與脾胃

傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒腳攣

急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥

○見于脾胃承底

因其頭逆

試頭底雖然亦宜

東洞子曰芍藥

甘草湯加減之方

也故當有變急症

煥按當有嘔症此

方主水病曰雖利

心下續堅滿者下

利而腹空故遍身

水氣直飯心下也

咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾姜湯與之以

復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與

之其脚即伸若胃氣不和讖語者少與調胃

承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

甘遂半夏湯各治芍藥甘草湯證而心下鞅滿

大嘔甘遂者試甘遂三枚分半夏十二枚錢

分芍藥五枚甘草指大一枚各八分

右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半斤

續與此湯續得下利水氣盡而愈故曰此為留飲欲去

故也

少廣現時時... 且日毒藥不... 言

藥其甘州... 煎取六勺

煎取六勺... 煎取六勺

煎取六勺... 煎取六勺

煎取六勺... 煎取六勺

煎取六勺... 煎取六勺

煎取六勺... 煎取六勺

煎取六勺... 煎取六勺

煎取六勺... 煎取六勺

和藥汁煎取二合頓服之

以水二合六勺煮取四勺去滓以蜜

四勺和藥汁煎取六勺

○病者脉伏其人欲自利利反

甘快雖利心下續堅滿此為留飲欲去故也

芍藥甘草附子湯

治芍藥甘草湯證而惡寒

附子者芍藥甘草各二兩

一錢二分附子一枚六分

已上三味以水五升煮取一升五合去滓分

溫服

以水二合煮取六勺

發汗不解反惡寒者虛故也

○藏躁之藏與藏  
堅癢之藏同此陰  
中急躁色慾妄動  
也每以狂疾者服  
此方如神故吉子  
於此獨不刪藏字  
可謂得矣弗可容  
易看過

○粉之說紛紛誰  
知其是非然余謹  
案是甘州粉也何  
則吐涎吐虫此是  
病危篤欲絕之時  
多有焉急迫至劇  
者心腹痛死謂朝  
發夕死夕發朝死  
非藥力不及是也  
且日毒藥不止言

甘麥大棗湯

治急迫甘州而狂驚小麥者

甘草三兩

四分五厘

小麥一升

二分四分

大棗十枚

四分

右三味以水六升煮取三升分温三服

以水一合

二勺煮取六勺

婦人藏躁喜悲傷欲哭象如神靈

女吸作數欠伸天

甘州粉蜜湯

治吐涎吐虫心痛發作有時者

甘州二兩

二錢

粉一兩

一錢

蜜四兩

四錢

右三味以水三升先煮甘州取二升去滓內

雖剛烈之藥不能治之而此方能救之亦何神也急食甘以緩之之謂也其如是故下味甘草煮汁而不足再內甘草粉又內蜜以助其藥勢而後始有摩西日之力焉其他稱溫味甘熱而此但曰粉且又于甘草下故余知之不啻以此知之而已經驗無算故居恒每感云當死者我能使之起勿謂余誕又按甘草一名粉草者蓋本于斯反可以為微

粉蜜攪令和煎如薄粥溫服一升差即止

以水

九勺先煮甘草取六勺去滓內粉蜜攪令和煎如薄粥

入不飲必煎服

蠅蟲之為病令人吐涎心痛發作有時毒藥

不止即以此水三升煎取一升五合去新合

生姜甘艸湯治救唾涎沫不止

生薑大棗

心下痞

甘硬參急迫者煎而飲之

生薑五兩錢人參三兩分甘草四兩大棗十

五枚各八分水十升煮取三升分三服

色  
○生薑甘艸湯東

洞子曰當有心下

痞鞭強急之症

○甘艸乾姜湯京

洞子曰當有急迫

之証

治久痢兼用承氣

丸

四逆輩本出于此

方而卻為四逆之

後方有再快之功

焉

大率急卒逆冷者

宜此方大病在轉

右四味以水七升煮取三升分溫三服

肺痿數唾涎沫不止咽燥而渴四兩大棗十

甘草乾姜湯治厥而煩躁甘多涎唾乾者

甘草四兩錢乾姜二兩五分下五大棗小不去

右咬咀以水三升煮取一升五合去滓分溫

再服以水一合二勺煮取六勺起以心煎於高煎毒藥

肺痿吐涎沫而不咳者其人不可遺尿小

便數以然者以上虛不能制下故也此為



此藥自大木解

少下變也

○前凡于芍藥甘

草湯及調胃承氣

湯吳檉姑曰前

昔藥也言藥食不

前藥之故與圖虛

併

黃姑新或小而前

時善或新前之水

甘州藥也

東師下口如也

肺中冷，必眩，多涎唾，甘州乾姜湯以溫之。若

脈湯已渴者，屬消渴。○傷寒脈浮，自汗出，小

便數，心煩微惡寒，腳攣急，反與桂枝湯欲攻

其表，此誤也。得之便厥，咽中乾，煩躁吐逆者

作甘草乾姜湯與之，以復其陽。若厥愈足溫

者，更作芍藥甘草湯與之，其腳即伸。若胃氣

不和，讖語者，少與調胃承氣湯。若重發汗，復

四加燒鍼者，四逆湯主之。具類聚下

東洞丁曰此方

甘艸君藥也

乾姜治結滯之水  
毒故傍治小便清  
利

清穀之清與圖通  
者鑿也言穀食不

化無臭穢故曰清  
穀也小便清利亦

爾言飲而直尿且  
色不變也

如葱白大有驗

四逆湯治四肢厥逆甘草身體疼痛附子下利清

穀附子或小便清利乾姜者甘草

甘草二兩一分乾姜一兩半附子一枚各九分

右三味咬咀以水三升煮取一升二合去滓

分温再服強人可大附子一枚乾姜三兩以水

一合五勺煮取六勺

傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣

急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥

○說見于調胃承氣

湯

○當起之者宜服

○說見于桂枝湯

標

病發熱以下反麻黃湯症已但以日

咽中乾，煩躁吐逆者，作甘艸乾姜湯與之。以復其陽。若厥愈足溫者，更作芍藥甘草湯與之。其脚即伸。若胃氣不和，譫語者，少與調胃承氣湯。若重發汗，復加燒鍼者，四逆湯主之。○傷寒醫下之續得下利，清穀不止，身疼痛者，急當救裏，後身疼痛，清便自調者，急當救表。救裏宜四逆湯，救表宜桂枝湯。○病發熱，頭痛，脈反沉者，不差，身體疼痛，當救其裏。○

脉沉為四逆湯症  
非可從

○諸凡于卦卦為

○賞吐之者宜服  
瓜蒂散上文皆瓜  
蒂症故知之

脉浮而遲表熱裏寒下利清穀者○利不渴者屬大陰以其藏有寒故也當溫之宜服四逆輩○少陰病脉沉者急溫之○少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐如得之手足寒脉弦遲者此胸中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急溫之○大汗出熱不去內拘急四肢厥又下利厥逆而惡寒者○大汗若大下利而厥冷者

真寒修燥快寒真熱之辨

嘔而脈弱云云條皆舉証之相反者也其為難治實然然空論也不足以為據

二十六平水藥人末二條皆霍亂病且最末條恐通脈四逆湯

此方乾姜君藥也乾嘔不止者加梗米

○下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻

其表溫裏四逆湯攻表桂枝湯嘔而脈弱

小便復利身有微熱見厥者難治吐利汗

出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者○既吐

且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外

熱脈微欲絕者

通脈四逆湯煥案治前方證而氣嘔倍加者

甘草二兩一錢附子一枚五分乾姜三兩一錢

五分

東洞子曰當作

附子大者一枚以

干姜知其然甘草

新校正作二兩是

也

加減法不足信之

身反不惡寒以下

二十六字亦攙入

然空論也

加葱白大有驗不

拘面色

云云

裏寒外熱外寒裏熱之術治傷寒少陰症及下利之緊要不可不知說具

裏寒外熱外寒裏熱之術治傷寒少陰症及下利之緊要不可不知說具

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫

再服其脈即出者愈後加減法面色赤者加

葱九莖腹中痛者去葱加芍藥二兩嘔者加

生姜二兩咽痛者去芍藥加桔梗二兩利止

脈不出者去桔梗加人參二兩煮如

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微

欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾

嘔或咽痛或利止脈不出者○下利清穀裏

子白虎湯標

對黃風氣...

○東洞子曰當有

心下輕病也辨之

藥徵人參條下

○苦熱...

○東洞子曰當有

心下悸惡寒症

變案嘗曰四逆加

人參湯症而悸者

寒外熱汗出而厥者

四逆加人參湯治四逆湯證而心下痞鞅

者明於四逆湯方內加入參一兩

煎甘草附子各七分

煎右四味煮如本方

惡寒脈微而復利利止亡血也

茯苓四逆湯治四逆湯證而悸者

茯苓六兩一分人參一兩二分甘草二兩五分

恐是脫字又按此條方證似不相對

○東瓜干曰當青

○若無猪膽代之

以水銀或鉉丹或黃金水却有効

已上數方中此方最如神篤志者記

之東瓜干曰當青

慢驚風危篤者主

乾姜二兩半附子一枚

各三分八厘

甘草二兩

右五味以水五升煮取三升去滓溫服七合

日三服

以水一合煮取六分

發汗若下之病仍不解煩躁者

通脈四逆加猪膽汁湯 煖案四逆湯證而煩

躁

猪胆者

於四逆湯方內加猪膽汁半合

四如無猪膽以羊膽代之吐已下斷汗出而

厥四肢拘急不解脈微欲絕者



○當有下利煩躁

惡寒証

此方晝日煩躁夜

則安眠者實能治

之大奇也

○東師七日音音

○夢遺七痛也

乾姜附子湯以生燠案治下利附子乾嘔干者

乾姜一兩一分錢附子一枚一分錢

右二味以水三升煮取一升去滓頓服以水合

八勺煮取六勺燠中藥燠子惡寒燠者

下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜

不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者

附子粳米湯治腹中雷鳴附子半夏或

嘔吐半夏者粳米附子一枚三分半夏一分甘

艸一兩

二分

大棗十枚

五分

粳米半升

錢二

一匙

右五味以水八升煮米熟湯成去滓溫服一

升日三服

以水一合六分

煮取六分

煎良藥大棗

服中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐而安

蕙苒附子散

治胸中痺

蕙苒附子

惡寒者

蕙苒仁十五兩大附子十枚

等分

剉散

一合

右三味杵為散服方寸匕日三服

胸痺緩急者

與棗

不味

干姜

又曰此散

服如

何

日三

用之

為治

疝然

眩甚

又曰

此方

為諸

烏

○寒氣水氣也

○東洞子曰當有

惡寒或浮腫症

煖曰主諸水氣者

又曰此散

又曰此散

又曰此散

又曰此散

又曰此散

又曰此散

頭劑後方○緩急亦水氣之變也緩猶痿謂痿弱不可舉也急者攣急

○此方亦生水氣之變黃金水亦腹無積聚四字於方極為刺語恐記者記也吉用百

○東洞子曰當有氣逆証寒証

薏苡附子敗醬散三治身甲錯腹皮急

附按之濡如腫狀薏苡附子腹無積聚者

薏苡仁半斤附子二分敗醬五分炒 人乳

右三味杵為末取方寸匕以水二升煎減半

白頓服小便當下以水一合煎減半

腸癰之為病其身甲錯腹皮急按之濡如腫

狀腹無積聚身無熱脉數此為腸內有癰膿

白通湯煖案治乾嘔下利附而頭痛葱者

當有惡寒症  
干姜附子湯症而  
頭痛氣逆者主之

白葱白四莖

二錢

乾姜一兩

附子一枚

白

右三味以水三升煮取一升去滓分温再服

以水一合八分

少陰

病下利脉微者

瀉以乾

白通加猪膽汁湯

煖案治

白通湯證而厥逆

附乾嘔

乾姜猪胆

煩躁劇

人尿

者水二升

煮取半

葱白四莖乾姜二兩附子一枚

人尿

五合猪膽汁

合

子

煎

無

煎

薑已上三味以水三升煮取一升去滓內膽汁

葱白倍用可也  
上方同  
今代入尿以水銀  
有効黃金水亦可  
也

○日服湯，脈暴出者死。實爾實爾，不獨此方爾。諸厥逆脈伏者，服湯後微續漸出者，嘉兆也。

○強人弱人異服度者，弗可謂無也。亦何剛乎？烏頭桂枝湯曰：初服二合，云云。烏頭湯曰：不知盡服之，皆謹之至也。執七之間，莫本諸。

人尿和令相得分溫再服，若無膽亦可用。

水以

一合八勺煮取六勺知人尿胆汁服 ○少陰病下利，脈微者與。

白通湯利不止，厥逆無脈乾嘔煩者，白通加

豬膽汁湯主之。服湯脈暴出者死，微續者生。

大烏頭煎 治毒繞臍絞痛，或自汗出手足厥

冷者 烏頭大者五枚

錢三

右以水三升煮取一升，去滓內蜜二升煎令水氣盡，取二升強人服七合，弱人五合，不差。

○刪腹痠字者亦記者訛也

已下二方若輕病則去蜜水煎服亦可也

○東洞子曰當有自汗盜汗浮腫症

○燮曰以上二方與烏頭桂枝湯大

同小異譬如仲其救濟之妙不可勝數矣如略說見于烏頭桂枝湯標

明日更服不可一日再服

以水九勺煮取三勺去滓內蜜六勺

煎取六勺○腹痛脉弦而緊弦則備氣不行即惡

寒緊則不欲食邪正相搏即為寒疝寒疝遠

大臍痛若發則自汗出手足厥冷其脉沉弦者

烏頭湯

治骨節疼痛不可屈伸

烏頭

看自汗

黃耆

或盜汗

黃耆

若腹絞痛

烏頭

者

麻黃芍藥黃耆甘州各三兩分川烏五枚分

咀以蜜二升分煎取一升分即出烏頭

好古之士勿失其機。病歷節者每節皆患也。非惡辭之例。刪之者記者。能也。攻五藏者言病勢盛而遍于腹。

內也。

第一食一升米酒

同。

宜麻寒附干湯

證期却少寒厚水

氏失少以成感更

臨麻丹并道之特

○東洞子曰當有

心下悸及嘔而腹

痛症

與諸麻黃劑相表

。

右五味以水三升煮取一升去滓

內蜜煎中夏煎之服七合不知盡服之

七勺煮四味取九勺去滓

內蜜煎中夏煎之服七合不知盡服之

病歷節不可屈伸疼痛不可屈

伸寒疝腹中絞痛賊風入攻五臟拘急不

得轉側發作有時使人陰縮手足厥逆

赤丸治心下悸

者四兩茯苓四兩半夏四兩

附子者四兩

類聚方集覽下

一方用桂四兩

裡也宜為後方于

金方發汗圓加大

附子一名神丹湯

神丹與直朱同所

謂神丹甘遂之神

丹是也。以知為度

謂腹眩也寒氣水

氣也

○宜亦家附子湯

同

治一食一行者附

子湯同

麻黃湯而盛于頭

痛必止。止癢者言

按古之士必大其難。麻黃湯者必出非發熱之因。服之者必

烏頭二兩細辛一兩兩半夏四兩一七

赤石四味末之內真朱為色煉蜜丸如麻子大

先食酒飲下三九日再夜一服不知稍增之

以知為度○寒氣厥逆風入心正

真武湯治心中躁在身攣動在振振欲擗地

附子在小便不利在或嘔在若下利附子若拘

痛附子者夏黃芩茯苓芍藥生姜各三兩七分

朮二兩五分附子一枚分三枚黃芩一枚芍藥五厘





發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身

潤動振振欲擗地者

附子湯

治身體攣痛

附子芍藥

小便不利心下

痞

人參

若腹痛

芍藥

者

附子二枚茯苓芍藥各三兩

六分

人參二兩

四分

朮四兩

八分

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升

日三服

以水一合六勺煮取六勺

○少陰病得之一二日

○東洞子曰嘗有心下悸小便不利或痞鞭症藥徵辨之  
真武湯與此方大同小異筋惕肉瞤等症宜互相通用  
○金匱要畧下云婦人懷姙六七月脉弦發熱其胎愈服腹痛惡寒者小腹如扇所以然者子藏閉故也當以附子湯溫其藏

○天雄散東洞子曰失精家而小便不利臍下有動或惡寒或上通者主

之藥微有辨案藥微據本草附

方為說曰桂枝加

龍骨牡蠣湯條蓋

脫天雄散亦主之

六字此說實然然

彼主陰常強急此

方則主陰痿且大

有膜眩一錢七日

三服恐不可也

天雄即附子

宜與桂枝加龍骨

牡蠣湯條參觀

○東洞子曰集註

曰舊本有一服得

口中和其皆惡寒者當灸之○少陰病身體

痛手足寒骨節痛脈沉者

天雄散治小便不利木上通枝臍下有動龍骨

而惡寒附子者天雄三兩當作三枚木八

兩桂枝六兩龍骨三兩

右四味杵為散酒服半錢七日三服不知稍

增之半錢七日三服

梔子豉湯治心中懊懣者

梔子十四枚分香豉四合二錢

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉

煮取一升半去滓分為二服溫進一服得吐

者止後服以水一合六勺先煮梔子取一合去滓內豉煮取六勺

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛

倒心中懊懣○發汗若下之而煩熱胸中窒

者○傷寒五六日大下之後身熱不去心中

結痛者未欲解也○陽明病脈浮而緊咽燥

吐者止後服七字此因瓜蒂散中有香豉而誤傳於此今為刪正余亦從之以下倣之案懊懣多在太病差後日過食而發故服湯乃得吐而解大病差後食已胸中微煩昏沉者主之反覆顛倒者煩躁不眠不能安臥床之甚者也結痛亦是差後過食故

已

惡熱身重以上  
誤藥發懊懣者  
之初證也何必為  
蠶不可拘焉

下利後條或為上  
條虛煩注文而可  
乎不如刪之

口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身

重若發汗則燥心憤憤反讖語若加燒鍼必

壯悸揚煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣

動膈心中懊懣舌上胎者○陽明病下之其

外有熱手足溫不結胸心中懊懣饑不能食

射但頭汗出者○下利後更煩按之心下濡者

為虛煩也

梔子甘艸豉湯治本方證而急迫

甘草者

少氣者與短氣有微飲之短氣同

○東洞子曰已上方証以若字者寇扼子豉湯證之辭今裂而列之故敢加扼子豉湯証而六字以通其意也

○枳實扼子豉湯東洞子曰當有心中懊懣胸滿症

於扼子豉湯方內加甘草二兩分甘草

扼子豉湯證而若少氣者

扼子生薑豉湯 ○治本方證而嘔者生薑不飲茶

於扼子豉湯方內加生薑五兩錢對下消食

扼子豉湯證而若嘔者枳實○胃脘痛下其

枳實扼子豉湯治本方證而胸滿枳實者容庸

枳實三枚枳實扼子十四枚分豉一升二錢

右三味以清漿水七升空煮取四升內枳實

慎儼與胸滿或為  
難別乎按此心中  
鞭滿若熱痛耳  
以上四方粗無大  
異大概皆主差後  
宿食而獨此方為  
最勝然不加<sub>大黃</sub>  
者不足以<sub>立功</sub>

四  
煖康蓋射射原音

梔子煮取二升下豉更煮五六沸去滓溫分

再服覆取微似汗以水一合六勺先煮二味  
取八勺下豉煮取六勺

大病差後勞復者枳實梔子豉湯主之若有

宿食者加大黃如博碁子大五六枚水二合

梔子大黃豉湯三治枳實梔子豉湯證而閉黃

者煎梔子十二枚三分大黃六兩一分枳

實五枚七分豉二升一分錢射干大射鑿大音

右四味以水六升煮取二升分溫三服以水





○刺讀為齊，蓋古  
齊與刺通，故轉訛  
已

清火  
亦從發黃，兼用承

久久發黃為穀疸。○陽明病發熱汗出，此為

耐熱，越不能發黃也。祖頤汗出身無汗，劑頸而

還，小便不利，鵝卵石漿者，此為聚熱在裏，身

必發黃。○傷寒，凡身黃如橘，小便便

不利，腹微滿者，三長半煮，取一長半，大棗公

梔子，蘗皮，湯好，治身黃。蘗皮梔子發熱心煩者，甘草

訶梔子，各十個，五分錢，甘州蘇兩分力，黃蘗二兩

錢，再右五味以水四升，煮取一升半，去滓分

亦治發黃，兼用承氣丸。

溫再服

以水一合六分

○傷寒身黃發熱者

扼疔厚朴湯

五治心煩

胸腹滿

厚朴一兩者棗二兩

扼疔升麻湯

六分厚朴

枳實四兩

已吐衄者，以水三升半煮取一升半，去滓分

三服，溫進。得吐者，鼻後脈以水一合，四

湯寒，下後心煩腹滿，身不安者，熯之，裏自

扼疔，熯之，湯熯，治心中微煩者，其無汗，煩而

扼疔，每四枚，乾姜二兩，各一錢，熯之，出，凡處

○齊與陳並效神端  
○陳黃黃齊益古

之營因以此方處  
賦與此方者時  
茵陳蒿湯並出  
○柴不精則以不

○主<sup>九</sup>真心痛

凡病勢盛者宜倍

甘遂

此方與梔子散湯

茵陳蒿湯輩為表

裡大有再快之功

焉其他或為度用

後方亦得矣下方

亦同余常為兼用

右口味以水三升半煮取一升半去滓分二

服溫進一服得吐者止後服以水一合四

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者

大陷胸湯中治結胸大黃若從心下至小腹甘

鞭滿大黃者芒消若輸少醫又下之甘遂

大黃六兩九分芒消一升三錢甘遂一錢一分

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內

芒消煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利

所以得效者以苦  
消量多故也喜方  
者思諸

若結痼者每以  
蕎麥稗厚其心腹  
法見于大承氣湯

○主真少脈

○若不結胸以下  
茵陳蒿湯証也故  
知與此方有表裡  
之勢因以此方為

止後服

以水一合八勺先煮大黃取六勺  
去滓內芒消令消內甘遂末服之

太陽病脈浮而動數浮則為風數則為熱動

則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反

惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內

大拒痛胃中空虛客氣動膈短氣燥煩心中懊

懣陽氣內陷心下因硬則為結胸大陷胸湯

主之若不結胸但頭汗出餘處無汗劑頸而

還小便不利身必發黃也○傷寒六七日結

○刪但結胸已下者恐不可若刪之則非矣陷胸湯証。世有肩背急痛而俄死者急用之可以救之此所謂真心痛而具痛微肩背者已不急治之則氣發不待夕夕發不待朝者也病入重者肩背痛者無他譬猶腹中病沉結則偏覺脊脊苦痛也其初以大陷胸丸証日結胸者項亦強知之因救肩背急痛者甚多

胸熱實脉沉而緊心下痛按之石鞮者○傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無大熱者此為水結在胸脇也但頭微汗出者○太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至小腹硬滿而痛不可近者○傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已

下之不為逆必蒸蒸而振卻發熱汗出而解  
若心下滿而鞭痛者此為結胸也。大陷胸湯  
主之。但滿而不痛者此為痞。柴胡不中與之。  
宜半夏瀉心湯。

大陷胸丸

治結胸

杏仁  
甘遂

若項背強

葶藶大  
黃芒消

者

大黃半斤

八兩

葶藶半升

六兩

芒消半升

十兩杏仁

半升

六兩

右四味

搗篩二味附杏仁芒消

合研如脂和散取如彈丸一枚別搗甘遂末

○治真心痛

無葶藶以大戟代

按白蜜一合水二

升此蜜為十分之

一也。以水一合二

勺準之。則蜜一勺

二撮也。故曰蜜下

為強。或謂強水濕布水拉撲哉。兼用蕎麥糝摩法見于大承氣湯。

凡厥為青眼之狀  
於身實一和以自  
○或必麻

飛亦主之卷一內

○實有心煩症

治心痛

有瘕瘕急痛後死

者主之說謂于大

陷胸湯搗

○註即前五本

一錢七白蜜二合今一水二升二合煮取一

升六溫頓服之一宿乃下如不下更服取之

為效禁如藥法煎當昔與三

結胸者項亦強如柔痙狀下之則和

小陷胸湯治小結胸者病正在心中按之

黃連一兩四分半夏半升二分枳實大者一

個八分右三味以水六升先煮枳實取三

升去滓內諸藥煮取二升去滓分溫三服以

○結胸病正在胸中不在心下心中當作心中恐轉訛

五苓散標注宜併觀曰亦可服與他稱亦主之者一例也

○治心痛

枳實一兩以白酒煎為膏服之治喘息效驗者

一合八勺先煮枳實取九勺內二勺味煮取六勺

○小結胸病正在心下按之則痛脉浮滑者○

病在陽應以汗解之反以冷水灌之若灌之

其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲

飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓

散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白

散亦可服

枳實薤白白酒湯治胸背痛

枳實薤白酒

喘息



咳唾括萹實者括萹實一枚六分薤白半

升二錢四分白酒七升二合

右三味同煮取二升分溫再服取六分服

胸痺之病喘息欬唾胸背痛短氣寸口脈沉

而遲關上小緊數

括萹薤白半夏湯 治前方證而嘔半夏者

括萹實一枚六分薤白三兩九分半夏半升一分

白酒一斗三合

○東洞子曰當有嘔或胸腹鳴症真心痛

東洞子曰嘗有

欲吐症

謹案曰治温温欲

吐者此本于四逆

湯條實是瓜蒂症

然但曰温温欲吐

而已瓜蒂之功豈

盡於此哉

真心痛真頭痛及

產後鬱胃忽暈絕

者並胸痺皆主之

或舌疽或結毒入

眼及黃痘耳鳴又瘰疾骨蒸者

右四味同煮取四升温服一升日三服

同上方

胸痺不得卧心痛徹背者

瓜蒂散 治温温欲吐者

瓜蒂赤小豆各一分

五分

右二味各别搗篩為散已合治之作一錢匕

以香豉一合

二分

用熱湯七合

匕

煮作稀糜

去滓取汁和散温頓服之不吐者少少加得

快吐乃止諸亡血虛家不可與瓜蒂散

下切痼疾結在上部而胸中滿者皆宜此方

又大頭痛有時發者發時即服之有效。凡服瓜蒂散從三分至五分不宜多服已須臾以烏羽或紙繩徐徐摩拂咽中以挑涎其吐可也又曰亡血家大禁之然產後暈倒者此散血逆攻也改服此方病人手足云云條恐不必此方所主也戒慎蓋在此間曰吐方之賢於瓜蒂者有青橘散在詳于類聚方後編○文蛤散說見于玉苓散標注

病如桂枝證頭不痛項不强寸脉微浮胸中痞鞭氣上衝咽喉不得息者此為胸有寒也當吐之○病人手足厥冷脉乍緊者邪結在胸中心中滿而煩饑不能食者病在胸中當須吐之○宿食在上脘當吐之

文蛤散

治渴者

文蛤五兩

錢十

右一味為散以沸湯和一錢七服湯用五合病在陽應以汗解之反以冷水漬之若灌之

其熱被劫不得去，彌更益煩，肉上粟起，意欲

飲水，反不渴者，服文蛤散。若不差者，與五苓

散。寒實結胸，無熱證者，與三物小陷胸湯。百

散亦可服。○渴欲飲水不止者

大半夏湯

治嘔吐

半夏

而心下痞鞭者

半夏二升

二錢四分

人參三兩

三分

白蜜一升

二錢五分

右三味以水一斗二升和蜜揚之二，百四十

遍煮取一升半，溫服一升餘，分再服。

以水三合四勺

○東洞子曰：外臺云：嘔，心下痞，顛者，今從之。胃反之病，因急結，故大便秘閉，秘閉，故味逆不止。若服蜜，則急結愈，大便通，而後嘔吐得止。

○千金方云：治胃反不受食，食入即吐者。

附附以備多

煮取六勺。○胃反。嘔吐者。

小半夏湯。治吐而不渴者。下聖。治心下痞。噯噯。

半夏一升

二錢四分

生姜半斤

一錢六分

右二味以水七升。煮取一升半。分溫再服。以

二合八勺。○吐家本渴。渴者為欲解。今反不

渴。心下有支飲。故也。○黃疸病。小便色不變。

欲自利。腹滿而喘。不可除熱。熱除必噦。噦者

主。○諸嘔吐。穀不得下者。胃氣不和。噦者不

○黃疸病條恐方

證不相對。對黃疸

或首及胃。甚毒。諸

熱同。黃疸。云。即中

○泄與半夏。乳作

○此與半夏厚朴湯同病然云咽中如有多鬱者毒結著于咽中僅為有小異

憤憤心亂也

生姜半夏湯 治似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦

噦心中憤憤然無奈何者

半夏半升三錢 生姜汁一升四勺

右二味以水三升煮半夏取二升內生姜汁

煮取一升半小冷分四服日三夜一嘔止停

後服以水一合二勺煮半夏取八勺內生姜汁煮取六勺

病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦

心中憤憤然無奈何

又賦詰野野實益可少又外續葉心藉七天可

宜與山木四寸處

案神部錄卷良

之下出灸之

神部破食肉中

神部少不望即中

對遠又案千金并

東師七日當食

○東師七日當食

○東師七日當食

○東師七日當食

○東師七日當食

○東師七日當食

○東師七日當食

○東師七日當食

○東師七日當食

○東師七日當食

○東師七日當食

○東師七日當食

小半夏加茯苓湯長治小半夏湯證而眩悸

者并茯苓夏一分錢生薑半斤一分錢茯苓

二兩五分并茯苓半夏一分二錢煎作三兩

半右三味水七升煮取一升五分溫再服

煮取一升五分○卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸

者○先渴後嘔為水停心下此屬飲家

半夏苦酒湯治咽中生瘡音啞

半夏十四枚五分雞子一枚去黃雞子殼置以

少少噉之

○東師七日當食

右二味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀環

中安火上令三沸去滓少少含嚥之不差更

作三劑

少陰病咽中傷生瘡不能言語聲不出者

半夏厚朴湯治咽中如有炙轡半夏生薑或嘔生

或心中悸茯苓者半夏一升二錢厚朴三兩

三分茯苓四兩四分生薑五兩五分乾蘘葉二兩二分

右五味以水七升煮取四升分溫四服日三

○東洞子曰當有  
悸症又案千金作  
胸滿心下堅咽中  
帖帖如有炙肉吐  
之不出吞之不下  
案帖帖黏者貞  
宜與近方四七湯  
併考且其方正同  
又加桔梗枳實益可也又代蘇葉以蘇子尤可



或加伏龍肝可  
又為無用劑

二刺毒亦同

夏末邪之氣散盡

熱以又曰下利半

煎之至少非至

○東桐子曰當有

心下痞證証

或五味水煎合生

姜汁服或加伏龍

肝

夜一服

以水一合五勺煮取六勺

婦人咽中如有炙蠶

半夏乾姜散

治乾嘔

姜吐

通涎沫

半夏者

半夏乾姜各等分

煮取六分

右三味杵為散取方寸匕漿水一升半

二合

煎取七合

分頓服之○乾嘔吐逆吐涎沫

乾姜人參半夏丸

治嘔吐

干姜

不止

生美心

下痞鞭

人參者

○

乾姜人參各一兩

七分

半夏二兩

一錢五分

大

或為無用方

此方之功專在妊  
婦則姓娠二字不  
可刪世醫多憚姓  
婦用半半兒者不  
通之至也非生物  
無功又曰一味半  
夏末服之治此症  
二陳湯亦同

右三味末之以生姜汁糊為丸如梧子大飲  
服十九日三服○姓娠嘔吐不止

半夏瀉心湯治心下痞鞭

人腹中雷鳴

半夏

者夏半夏半升

九分

黃芩乾姜人參甘草各

三兩大棗十枚

各四分  
五厘

黃連一兩

二分  
五厘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三

升溫服一升日三服

以水二合煮取一升二  
去滓再煎取六分

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以

○半夏瀉心湯

洞子曰嘔而腸鳴

下心下痞當作心

下痞鞅

雷鳴因水氣也

○東洞子曰常有

急迫症

○東洞子曰常有

急迫症

急迫症

他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖

已下之不為通必蒸蒸而振卻發熱汗出而

解若心下滿而鞅痛者此為結胸也大陷胸

湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與

之○嘔而腸鳴心下痞者寒濕濕俗則因不

甘草瀉心湯熱治前方證而心煩不得安者

半夏瀉心湯方內加甘州蓋兩一分其蓋益

傷寒中風醫反下之其人下利且數寸行穀

考直法

東師七日言

孤惑病蓋狂証

也此症或為烏梅

開鷓鴣菜湯症半

蝕於喉者喉痺之

類蝕於陰者肚門

之疾

之疾

之疾

之疾

之疾

家亦為要方

不化腹中雷鳴心下痞鞅而滿乾嘔心煩不

得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益

甘甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞅

也○孤惑之為病狀如傷寒默默欲眠目不

得閉卧起不安蝕於喉為惑蝕於陰為孤不

欲飲食惡聞食臭其面自乍赤乍黑乍白蝕

於上部則聲啞又蒸蒸而短唇發熱汗出而

生薑瀉心湯治半夏瀉心湯證而嘔生者

如數法

東師子日當

半夏瀉心湯方內減乾姜三兩芎藭四兩

乾姜

九分

射草人參大棗黃芩

各四分

黃連

乾薑

各五分

生薑

六分

乾薑

少石訕味煮如半夏瀉心湯

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噦

食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者

吳茱萸湯以治胸滿

吳茱萸

心下痞鞭參而嘔

者

吳茱萸

參三兩大棗十

只按心下痞鞭嘔  
而胸滿腹拘急者  
專生之厥者宜臥  
冷小兒平生頻吐

白沫者

得湯反劇者宜厚

朴生姜半夏甘草

人參湯此再快方

也恐脫文

少陰病條方症不

相對此四逆湯症

乎

東洞子曰當有

吐逆訖

三枚

各四分  
五厘

生薑六兩

九分

右四味以水七升煮取二升去滓溫服七合

日三服

以水二合一  
勺煮取六合

○食穀欲嘔者屬陽明

也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬太陰也○

少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者○乾嘔

吐涎沫頭痛者○嘔而胸滿者

厚朴生姜半夏甘草人參湯

治胸腹滿

厚朴  
人參

而嘔生者太厚朴生姜各半斤

一分  
二分半

類聚方集覽下

○東洞子曰當有  
心中悸心煩上逆  
症一

不熱躁而汗不  
解醒中厥斜久  
東洞子曰九

大夏半升九分人參中兩五分甘草二兩三分

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升

日三服以水一斗煮取六升分發汗後腹脹滿者下之

黃連湯治心煩連轉心求痞欲嘔吐半裏正

衝桂枝者黃連甘草乾姜桂枝各三兩大棗

十二枚各四分人參二兩三分半夏半升九分

右七味以水一斗煮取六升去滓溫服一升

日三服夜二服以水一斗煮取六升分傷寒胸中有熱

胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者

乾姜黃連黃芩人參湯 治心煩黃連黃芩心下痞

鞭人參吐干姜下黃芩者 一兩二分 半黃半共

乾姜黃連黃芩人參各二兩六分二兩大棗

右四味以水六升煮取三升去滓分溫再服

以水一合八勺煮取六勺○傷寒本自寒下醫復吐下之

寒格更逆吐下若食入口即吐

大建中湯 治腹中大痛膠飴嘔不能食干姜人參

東洞子曰此方

主心中煩悸及心下痞鞭而吐下者

也 胃反者主之

中藥之類上血

或為兼用方



吐蛇

裁頭蛇者  
東師子曰當木

公賦而下  
大煎為膏  
何類雜  
或麻  
野不修

皮起出見者因  
腹中有虫也

海云凡寸之

背腹皮起如有頭足

膠飴

者

大毒

蜀椒二合

六分

乾姜四兩

一分

人參二兩

六分

右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴一

升微火煎取一升半分溫再服如一炊頃可

飲粥二升後更服當一日食糜溫覆之以水

六分煮取八分去滓

內膠飴

取六分

何類

雜

三兩

六分

何類

雜

心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮

起出見有頭足上下痛而不可觸近

或云此方去芍藥  
良

治淋家心煩而小便不利者

治痢

阿膠雞卵二味微火煎為膏服之治心煩而不得眠者

○東洞子曰當有心下痞腹強急症

黃連阿膠湯

治心中悸而煩

黃連黃芩

不得眠

桂枝雞子黃

者黃連四兩

一分錢

黃芩一兩

三分芍藥

二兩六分雞子黃二枚

一分

阿膠三兩

九分

右五味以水五升先煮三物取二升去滓內

膠烱盡少冷內雞子黃攪令相得溫服七合

日三服

以水

合半煮三物

取六勺去滓內膠烱盡小冷內雞子黃攪令相得

少陰病得之二三日以上心中煩不得卧

黃芩湯

治下利

黃芩腹拘急

芍藥者

下劑加禹餘糧大  
有即功其他下劑  
藥宜加禹餘糧

公才藥錄  
○東師子曰當宜

黃芩三兩大棗半夏枚

各九分

甘草芍藥各二

兩

六分

人右四味以水兩斗煮取二升去滓溫

服

升日再夜一服若嘔者加半夏半升生

六姜三兩

以水二合

煮取六勺

不飲

參詳

半夏

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔

者黃芩加半夏生薑湯主之與黃芩湯或否

黃芩加半夏生薑湯治本方証而嘔

生薑

於黃芩湯方內加半夏半升生薑三兩

黃芩黃芩大棗生薑

各四分  
五厘

甘草芍藥

各三分  
半

黃芩夏

九分

右六味煮如黃芩湯

而煎

太陽與心陽合病自下利者與黃芩湯若嘔

者乾嘔而不利者不與黃芩湯

六物黃芩湯

治心下痞鞭

人參乾嘔

干姜下利

黃芩大棗 北衝

桂枝者

黃芩大棗各半長半

黃芩人參乾姜各三兩大棗十二枚

各四分  
五厘

桂枝二兩

五分

半夏半升

九分

藥宜收禹繪鈔  
春明其外才脈  
可疎其高繪鈔大

○東洞子曰當首  
心下痞鞭症

香艱之亦經膏峻

黃然然無對下味

對曰其則言義對

又當可或出派

心當以血而或事

或對非其或對

東風子曰題曰

說見于小柴胡湯

標

三兩

東風子曰首言

右六味以水七升煮取三升分溫三服以水

六勺煮取四勺○乾嘔下利

三物黃芩湯治心胸苦煩者

黃芩一兩四分苦參二兩八分乾地黄四兩六分

右三味以水六升煮取二升溫服一升多吐

下魚以水一合八分煮取六勺煮取二升去滓服一升

婦人在草蓐自發露得風四肢苦煩熱頭痛

者與小柴胡湯頭不痛但煩者

○東洞子曰當有心悸症一李作白頭翁三兩

○東洞子曰雖曰產後非唯言產後也當以血證為準又當有急迫症

按曰非唯言產後者然然產後下利者服之亦殊有効

白頭翁湯

治熱利下重

白頭翁  
秦皮

心悸黃連者

白頭翁二兩黃連黃栢秦皮各三兩

各七分  
五厘

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升

不愈更服一升

以水二合  
煮取六分

熱利下重者○下利欲飲米者以有熱故也

白頭翁加甘草阿膠湯治前方證而有血證

阿膠急迫者

白頭翁湯方內加甘草阿膠各二兩

各一分

必不封難

○東師子曰當有

○東洞子曰當有

煩渴症

案水病而心下痞  
鞭煩渴而上逆者

木右六味以水七升煮取三升半內膠令消盡

分溫三服

白頭翁黃連黃柏秦皮

各六分

甘草阿膠

各四分

和分藥右六味以水一合七勺煮取六勺去

醜滓肉膠令消服散心下痞望面赤黃黑其

產後下利虛極

木防已湯

治水毒心下痞鞭

人參

煩渴

石膏者合

木防已

二兩六分

石膏雞子大

一錢六分

桂枝二兩

或喘滿者專主之

方振文恐有脫落

東師子曰當有

○東洞子曰當有  
心下悸證

四人參四兩

分八

石膏半斤

六一

桂枝二兩

右四味以水六斗煮取三斗分溫再服

以水合

八勺者  
取六勺

條盡

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其  
脉沉緊得之數十日醫陛下之不愈水防已  
湯主之虛者即愈實者三日復發復與不愈  
者宜木防已湯去石膏加茯苓芒消湯主之  
木防已去石膏加茯苓芒消湯半治心下痞

入參



按木防已湯症而不煩渴心下痞堅及悸者專主之

賦本下身

水防已變少

小腫身四翅毒毒

○孟興獸同辨露

堅澀而悸者長煮木防已湯方內去石膏

加茯苓四兩芫消三合

右五味以水六升煮取三升去滓內芫消再

微煎分溫再服微利則愈

打防已

六分

桂枝

四分

人參茯苓

各八分

芫消

一錢二分

若右五味以水一合八勺煮取六勺內芫消

煮令消盡者即愈實者三日再煮再與不愈

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其

脉沉緊得之數十日醫吐下之不愈未防已  
湯主之虛者即愈實者三日復發復與不愈

者或五利以水一合八日黃連六分內四散

防已茯苓湯治四肢聶聶動  
茯苓防已芍藥水氣在

皮膚黃者防已而上衝挂者

防已黃耆桂枝各三兩六分茯苓六兩一分甘

草二兩四分

右五味以水六升煮取三升分温三服以水

○聶與腠同嫩弱  
小動見四肢聶聶  
此水氣之變也  
加水尤良

蘇合香丸同治  
八風脈且下痰血  
宜以五石為劑  
謝聖而小醫  
眼紫圓前  
治下之

○東洞子曰分量  
煎法非古今從外  
薑

風濕一作風水

八勺煮  
取六勺  
○皮水為病四肢腫水氣在皮膚中

四肢聶聶動者

防已黃耆湯  
治水病身重

防已  
未麥汗出惡風  
黃耆

生小便不利者

生小便不利者

防已四兩六分黃耆五兩七分木生五厘各三兩

大棗十四枚各四分甘草二兩三分

右六味以水六升煮取二升分溫三服以水一合

八勺煮  
取六勺  
○風溼脉浮身重汗出惡風者○治

風水脉浮為在表其人或頭汗出表無他病  
病者但下重從腰以上為和腰以下當腫及

陰難以屈伸

正氣

各四錢

甘州二兩

三

枳實芍藥散

治腹滿

枳實

拘攣

芍藥

或痛者

枳實芍藥各等分

右二味杵為散服

方寸匕日三服并主瘕膿以麥粥下之

產後腹痛煩滿不得卧○產後腹痛法當以

枳實芍藥散假令不愈者此為腹中有乾血

治腹痛宜生薑汁  
送下之  
服紫圓備急大陷  
胸輩而不得効者  
宜以此方為後方  
乃如神且下瘀血  
抵當輩亦同例也

○枳朮湯家洞子曰當有小便利利症。煥曰兼用承氣丸尤可。又曰嘗聞吉子時或以此方合他方以奏奇効。此於吉子則可於吾輩則不可以吾之不可學吉子之可又大不可也。方今妄為加減作合方者有焉豈可不思焉。子曰當言

○東桐子曰有瘕瘕而胸腹拘滿者主之

味著臍下宜芫蕪血湯主之亦主經水不利

枳朮湯治心下堅滿枳小便不利朮者

枳實七枚枳朮二兩枳長安盛三服一合

右二味以水五升煮取三升分溫三服腹中

硬即當散也以水一合煎取六勺煎土煎煎連煎煎

心下堅大如盤邊如旋杯水飲作煎

排膿散治瘕家胸腹拘滿枳實若吐粘痰枳或

便血雞者枳實六分枳實六分枳實六分

身味七日百歲

○東洞子曰當有嘔症又曰痞下脫

○清字

懸如懸飲之懸

○吞酸兼參連丸

○肝朱或者賦子曰當有心下痞症。熱曰瀉風承虛此亦可又曰

枳實十六枚

一錢六分

芍藥六分 桔梗九分

右三味杵為散取雞子黃一枚以藥散與雞

黃相等揉和令相得飲和服之日一服

挂枝枳實生姜湯

治胸滿實上逆挂枝或嘔生

者一和挂枝生姜各三兩

九分枳實五枚五分

右三味以水六升煮取三升分溫三服

以水一合

二內煮取六勺

○心中痞諸逆心懸痛

枳實薤白挂枝湯 治胸中痞

枳實厚朴薤白

而痛白者白枳實四枚厚朴四兩各八分薤

白半升錢六分桂枝一兩二括蕞實一枚四分

右五味以水五升先煮枳實厚朴取二升去

滓內諸藥煮數沸分溫三服以水一合六分先煮枳實厚朴

取八分去滓內諸藥煮取六分胸中痞塞默痞芬苔舌下甘

胸痺心中痞留氣結在胸胸滿脇下逆搶心

枳實薤白桂枝湯主之  
人參湯亦主之

橘皮枳實生薑湯治胸中痺枳實而嘔生

胸痺心中云云症  
若無水使不利心  
下痞鞭乃人參湯  
主之  
人參湯條可  
併考  
東洞子曰當有  
嘔証

主吃逆橘皮湯橘皮竹茹湯亦皆同

案當有心下痞鞭

証

凡曰亦主之者說

具于前或為兼用

後方亦可也乎此

在入人畧已

治吞酸兼參連丸

○東洞子曰當有

心下痞鞭證

者 枳實 橘皮 一斤

二錢四分

枳實 三兩

四分五厘

生姜

半斤

二錢二分

右三味以水五升煮取二升分温再服

以水一合

五勺煮取六勺

○胸痺胸中氣塞短氣茯苓杏仁甘

艸湯主之橘枳姜湯亦主之

茯苓飲

治心下痞鞭

參入

而悸

茯苓

胸滿

枳實橘皮

而自吐宿水

生姜

者

茯苓人參米各三兩

六分

枳實二兩

四分

橘皮一



砂干封... 賦曰... 藥上... 砂干封... 賦曰... 藥上... 砂干封... 賦曰... 藥上...

兩半分五 生姜四兩分八

右六味水六升煮取一升八合分溫三服如

人行八九里進之以水二合 煮取六勺

治心胸中有停痰宿水自吐出水後心胸間

虛氣滿不能食消痰氣冷能食

橘皮竹筴湯治胸中痺 橘皮而吃逆 竹筴者

橘皮二斤三錢二分 竹筴二升 大棗三十枚 生姜

半斤各九分 甘艸五兩五分 人參二兩一分

。吃逆一本作嘔逆

右六味以水一斗煮取三升温服一升日三

服

以水二合  
煮取六勺

○噦逆者

大棗三十枚生姜

橘皮湯

治胸中痺

橘皮

而嘔

生薑

噦

橘皮者

橘皮四兩

二錢

生薑半斤

四錢

右二味以水七升煮取三升温服一升下咽

卽愈

以水一合四  
勺煮取六勺

乾嘔噦若手足厥者

一升八合公試三服

桂枝茯苓丸

治拘攣

芍藥

上衝

桂枝

心下悸及

茯苓

○桂枝茯苓丸東  
洞子曰當有衝逆  
心下悸証又曰是非唯治婦人病方也。煥曰此催生之佳方一名奪命

圓又名催生湯案此條恐有脫誤然以臆解之曰以癥瘕害于妊娠故未  
及三月得漏下且  
不止而胎動者有  
焉或子死于腹中  
者有焉或經閉而  
非妊娠者有焉為  
死胎乎為血塊乎  
不易辨也經水始  
斷後三月許經血  
卻利或一日而止  
者亦有焉是妊娠  
而時胎受病以下  
血也非經閉凡妊  
娠中見血下者此  
子死于腹中之徵  
也或其後斷不見

經水有變

牡丹  
挑仁

或胎動

桂枝  
芍藥

者中

蘇  
蘇  
蘇

桂枝茯苓牡丹挑仁芍藥各等分

石五味末之煉蜜和丸如兔屎大每日食前

服一九不知加至三九

十日三服下

婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不

正胎動在臍上者為癥瘕害妊娠六月動者

前三月經水利時胎下血者後斷三月不血

也必以血不止若其癥不去故也當下其癥

益者有焉血下不  
正者亦有焉此所

謂漏下不止也癥  
者有塊之謂與上

癥瘕不同既為死  
胎非可育且未下

而為災故以為塊  
已若癥瘕則非此

方可下豈可謂當  
下其癥矣死胎見

種種變證者皆主  
之夫下死胎者用

他攻擊劑甚不可  
即促命期大可是

哉此解雖似牽強  
余屢有治驗且間見

芎歸膠艾湯治漏下  
阿膠腹中痛芍藥者

芎藭阿膠甘艸各二兩分艾葉當歸各三兩

四分芍藥四兩分乾地黄六兩分

右七味以水五升清酒五升合煮取三升去

滓內膠令消盡溫服一升日三服不差更作

以水一合清酒一合煮取

婦人有漏下者有半產後因續下血都不絕

者有妊娠下血者假令妊娠腹中痛為胞瘕

者有娠下血者假令娠腹中痛為胞瘕

○芎歸膠艾湯東洞子曰凡治吐血下血諸血證者不別男子婦人矣  
煥曰血證有不別  
男女者焉有不可  
不別者焉此有為  
而言已蓋欲救理  
學之弊也

婦人每有孕二三月  
月或五六月必墮  
胎不育者始覺有  
難輒服此藥續服  
不怠以及八九月  
或終十箇月而免  
不育之患者不數  
○代赭石湯宜有  
欲嘔証

旋覆花代赭石湯治心下痞鞭入噫氣不除

旋覆花者甘草旋覆花甘艸各三兩大棗十

二枚各四分人參二兩三分生姜五兩七分半

夏半升九分代赭石一兩一分

右件七味以水一斗煮取六升去滓再煎取

三升溫服一升日三服以水二升合煮取一升

勺○傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫

赤氣不除者

赤石脂禹餘糧湯 治毒在臍下而利不止 赤石

脂禹餘糧者 赤石脂禹餘糧各一斤 一錢六分

已上二味以水六升煮取二升去滓三服 以水

一合八勺 煮取六勺

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞅服瀉心湯

已復以他藥下之利不止醫以理中與之利

益甚理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹

餘糧湯主之復利不止者當利其小便

○東洞子曰此章非疾病醫義故不取雖然赤石脂禹餘糧湯證可從于此也又云當利其小便下方脫或云脫者五苓散余謂此猪苓湯詳見于古今方考

○言補氣艾蒿東洞子曰八...

○赤石脂 丁名桃

花石

治又痢

桃花湯 治腹痛下利便膿血

赤石脂 粳米

者大便

赤石脂一斤

六錢

乾姜一兩

一分

粳米一升

右三味以水七升煮米令熟去滓溫七合內

赤石脂末方寸匕日三服若一服愈餘勿服

以水二合煮取六分

○少陰病下利便膿血

者○少陰病二三日至四五日腹痛小便不

利下利不止便膿血者○下利便膿血者

大猪膽汁 治肛中乾燥大便澁者

○蜜皂莢末相和灌穀道中却膠於蜜煎豬膽汁法若急則用蠟油其法如蜜導且不及煎成之即用人家常用蠟挺下土瓜根末海羅汁和為挺用之亦如蜜煎汁且別服土瓜根末佳

又治難產用土瓜根內產門以為導且服之皆如上法

和海羅汁

大猪膽一枚瀉汁和醋少許以灌穀道中如

一食頃當大便出○陽明病自汗出若發汗

小便自利者此為津液內竭雖硬不可攻之

當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根

及與大猪膽汁皆可為導

蜜前導

主治見上

蜜七合

一味內銅器中微火煎之稍凝似飴狀攪之

勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如



軟味平夏葛粉

○藥徵可考

晝夜昏睡數日不覺者亦間有宜此方者

○東洞子曰虛煩當作煩躁

指長二寸許當熱時急作冷則硬以內穀道

中以手急抱欲大便時乃去之

酸棗仁湯 治煩燥

酸棗仁

而不得眠

甘者

酸棗仁二升

二錢四分

甘艸一兩

一分

知母茯苓等

藥各二兩

二分

右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥

煮取三升分溫三服

以水一合六勺煮酸棗仁取一合二勺內諸藥煮

取六

○虛勞虛煩不得眠

○水氣聚於心胸而腹中空虛喘咳不得臥者主之  
三日一劑可至三四劑此先服小青龍湯一劑乃進

○上氣說見于越婢加半夏湯標

葶藶大棗瀉肺湯

治浮腫

葶藶

效通喘鳴

葶藶迫

塞胸滿

葶藶

強急

大棗

者

葶藶搗丸如彈丸大五分

大棗十二枚

三錢

右先以水三升煮棗取一升去棗內葶藶煮

取一升頓服

以水

下合

先煮

棗取

一升

去棗

內葶藶

煮取

肺癰喘不得臥

○肺癰

胸滿脹一身面目浮

腫鼻塞涕出不聞香臭酸辛效通上氣喘

鳴迫塞○支飲不得臥

○宜壽疾

麻子仁丸 治平日大便秘者

麻子仁二升十二兩 芍藥枳實各半斤四兩 大黃

一斤厚朴一尺各八兩 杏仁一升六兩

右六味末之煉蜜和丸梧子大飲服十九日

三以知為度○跌陽脉浮而瀉浮則胃氣強

瀉則小便難浮瀉相搏搏大便則堅其脾為約

已椒蘆黃丸 治腹滿大黃口乾舌燥椒目二

便澁滯大黃者

○椒目治水氣故  
截癰  
傷寒或以此方間  
為兼用

和

防已椒目葶藶大黃各一兩

右四味末之蜜丸如梧子大先食飲服一九  
日三服稍增口中有津液渴者加苾消半兩  
腹滿口舌乾燥此腸間有水氣

蜀漆散

治寒熱發作有時

蜀漆雲母

而臍下有動

龍骨者

蜀漆雲母龍骨各等分

右三味杵為散未發前以漿水服半錢七

瘧多寒者名曰牡瘧

東洞子曰當有臍下動症發作有時因水氣之變非唯治瘧也寒熱往來似瘧狀者皆去之

○一切水氣痰飲  
之變胸滯心痛久  
咳勞熱腹脹肩背  
痛及脚氣或四肢  
痛或身體痛等痛  
引胸脇者皆主之  
或為兼用  
又云治水腫

十棗湯

治病

水在胸腹

芫花甘遂大戟

芫花甘遂大戟各等分

母各二分

右上一三味等分各別搗為散以水一升半先

煮大棗肥者十枚取八合去滓內藥末強人

服一錢匕羸人服半錢溫服之平且服若下

少病不除者明日更服加半錢得快下利後

糜粥自養

以水一合二勺先煮大棗二錢取六勺內藥末一錢頓服之

天陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人

夫有支飲家云云  
條此後世稱勞欬  
者已早服此藥乃  
可救之

○桔梗白散東洞  
子曰有結毒而濁  
唾吐膿者主之或  
宜為湯用之法如  
走馬湯  
煥曰以下三方救  
急之妙不可廢而記

藜藜汗出發作有時頭痛心下痞鞅滿引脇

下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未

和也○病懸飲者○欬家其脈弦為有水○

夫有支飲家欬煩胸中痛者不卒死至二百

日一歲

桔梗白散治毒在胸巴豆咽桔梗或吐下如膿

汁桔梗者貝母桔梗貝母各三分巴豆一分

右三味為散強人飲服半錢七羸者減之病

且雖畏壓弱者皆能治之五苓散標可併考又曰是

寫白散備急之三方不獨備于急卒而已諸痼難症結毒及廢疾之因宜  
為後方以攻之<sub>三</sub>其運用便存人人  
之畧也若善達其  
術則諸方為表裡  
乃互相成其用再  
快之妙不唯在此  
方爾亦不可不知  
焉夫濟世之士知  
治病有前方後方  
則思過半矣小建  
中湯條曰腹中急  
痛者先與小建中  
湯不差者與小柴  
胡湯不知者謂仲  
景亦有所不能邪

在膈上者吐膿而膈兩者瀉出若下多不止

飲冷水一杯則定

黃連瀉心湯

效而胸滿振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥  
臭久久吐膿寒如米粥者為肺癰病在陽  
應以汗解之反以冷水澀之若灌之其熱被  
劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反  
不渴者服文蛤散不差者與五苓散寒實  
結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可

此何似企望偶中者之為也余案此說甚非矣曰先與小建中湯先也者預設後方之言也其他設數方以速其功者不為少也因是觀之治有前後兼用方者古之道也明矣雖然前方不得其所則後方亦無効矣要之執己家之妙計但在方與症相對而已東洞翁之教人亦此耳夫登高者必自卑萬里之行必自一步飛失方證於近案未熟於

服

走馬湯

治胸腹有毒

巴豆杏仁

若心痛

巴豆杏仁

若腹

痛

巴豆者

巴豆杏仁各二枚

煮湯服之

右二味以綿纏推令碎熱湯二合捻取白汁

飲之當下老少量之通治飛尸鬼擊病

湯以熱

勺餘如上法

○中惡心痛腹脹大便不通

散

備急圓

治心

乾腹

卒痛

巴豆者

大黃乾姜巴豆各一兩

煮湯服之



速而不免目睫之謂者余謂之迷方之士豈可不思焉。桔梗白散卒  
中小兒驚風牙關  
不聞者入之鼻中

右藥各須精新先擣大黃乾姜為末研巴豆  
肉中合治一千杵用為散蜜和丸亦佳蜜器  
中貯之莫令歇氣

主心腹諸卒暴百病若中惡客忤心腹脹滿  
卒痛如錐刺氣急口禁停尸卒死者以暖水  
若酒服大豆許三四丸或不下捧頭起灌令  
下咽須臾當差如未差更與二丸當腹中鳴  
卽吐下便差若口禁亦須折齒灌之

○加膠皮尤良。

阿膠一味煎洗亦

奇。

四肢身體諸痛皆洗之有效。

○為多用劑是也。大麥汁能利小便。

礬石湯 治脚氣痿弱不仁上入搶心者

礬石二兩

右一味以漿水一斗五升煎三五沸浸脚良

治脚氣沖心

消礬散 治一身悉黃腹脹如水狀消石大便黑

消時澹礬者消石礬石各等分

右二味為末以大麥粥汁和服方寸匕日三服病隨大小便去小便正黃大便正黑是候

○黑疽腹滿者極  
為難治方上勿忽  
諾

○蛇床子楮木皮  
礬石各等分加五  
倍子以計煎洗陰  
中而後內藥尤良

賦也○黃家日哺夾發熱而反惡寒此為女勞  
得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下熱  
因作黑疽其腹脹如水狀大便必黑時澹此  
女勞之病非水也腹滿者難治

礬石丸治婦人經水不利下白物者  
礬石三分杏仁一分

右二味末之煉蜜和丸棗核大內藏中劇者  
再內之○婦人經水閉不利藏堅癢不止中

○宜先洗陰中而後內藥法如上方又治陰中腫痛

○黑煎即煎水

有乾血下白物

蛇床子散治婦人下白物陰中痒或有小瘡

者蛇床子仁亦一分五分

鑿石大味末之以白粉少許相合相得如棗大

綿裹內之自然溫

溫陰中坐藥

類聚方集

類聚方集



ノ誤日以下皆同○兼主以下八字○圈点有ヘシ三九丁六行ノ半复上加字有ヘシ四十二才ノ桂  
挂ハ桂枝ノ誤日未○太陽與以下十二字○圈点ヲ加ヘシ日ウ五行○黄芩ハ黄芩ノ誤四  
三才六行○陽脉以下八字○圈点ヲ除クヘシ四十四行○不得臥ノ臥字汗ノ誤四十四行  
○心胞若ノ三字四肢苦ノ誤四十七才未○四肢下ノ若字苦ノ誤日ウ行下七行同ノ難愈  
者ノ下ニ與五苓散乃愈ノ六字アルヘシ五十二才初行下ノ卷ノ大小承ノ下氣字ヲ脱ス  
三十四行○不韞者ノ三字墨引ハ誤五十二才行○宜桂枝湯ノ四字墨ヒキハ誤六十四行○  
心煩ノ下之濡ノ下元本黄芩ト有ハ誤今大黄ニ作ルノウセ行ノ惡對人厭煩翼日ノ汗  
心湯標ニ金瘡並ニ血淋ニ奇効有下補入スヘシ九丁ウノ挺出ハ挺出ノ誤才丁ウ○癥ハ癥  
ノ誤才丁ウノ觀ハ觀ノ誤才丁才○桂枝ハ桔梗ノ誤才丁ウ○胃氣不和ノ四字ノ圈点  
ヲ加ヘシ才丁ウ三行下止丁才六行九丁才三行皆同○喜悲傷才九丁ウ行ノ故藥ハ故余ノ誤五丁才  
行ノ及可ハ及可ノ誤日未○一分五厘ハ七分五厘ノ誤五丁才未○脉微ハ脉微ノ誤五丁才  
才行○半复ノ下半升ノ二字ヲ脱ス才五丁才未ノ燥躁ハ煩躁ノ誤日○附子一兩ハ一枚ノ誤

○下利下脉微者ノ三字カ又ハ下文不致カ有ヘシ日三行○服湯以下十一字  
「」域スル者太誤此七丁才四行○復ハ腹ノ誤日ウニ行○一方用桂ノ四字注文又桂ノ下  
四兩ノ二字有ヘシ此八丁才末○二九ノ誤日ウニ行○其人以下十四字墨引有ヘシ  
此九丁才末惡熱身重ノ一條恐クハ寫誤有シ三丁才○心下ヲ心中トシ鞭滿ノ下若  
熱痛ノ二字有ヘシ三丁才○胸ハ心煩ノ誤腹煩滿ハ胸腹滿ノ誤三丁ウニ行○葶  
菴半升元本半升誤今正ス此五丁ウ六行○直ハ真ノ誤此七丁才末○胸痺「」域ト○圈  
ト有ヘシ日ウ○取ハ作ノ誤日五行○咽下ハ咽中ノ誤此八丁四行○嘔家元本吐家誤今  
正ス三十九丁才五行○婦人ノ二字「」域有ヘシ四丁才一行○生姜ノ上ニ加字有ヘシ四十三  
丁才一行○麻黄ハ麻ノ誤四十五丁才五行○不得眠ノ注ニ雞子黄ヲ補入スヘシ日ウ行○  
四芍ハ六芍ノ誤四十七丁才一行○二分ハ九分ノ誤五十二丁ウ行○蜜導煎ハ蜜煎導ノ  
誤五十六丁ウ四行○諸痼瘕疾ハ諸痼難症ノ誤六丁才  
既試方○分温ハ温服ノ誤二丁  
四行○麻黄ハ麻仁ノ誤四丁才一行○心中温ハ心中温温日ウ行○憂ノ下傷字ヲ脱ス六丁

〔二行〕頭痛有熱但桂枝症而已若六七日不大便且小便不清者乃承氣症也服承氣湯則上衝得降若小便清者宜服桂枝湯之復煩者病未盡故也小柴胡湯有此例宜併觀之清便自調者謂清穀止也清穀雖止身疼痛未愈者猶宜四逆輩恐非桂枝湯症之稱陽明病者有潮熱譫語燥屎等之症是也

此書刻既成時之重ク病ヲ物モ覺エ又内ニモ以出ノク言出スノ杯モ有ク  
ラニ依テ人ノ摺立仕立等ノク取イワキ病床ニサヘ持ヨセラ見セトフ病愈  
テ能ミシハ誤字ノモマニアリ板ノサラハ殊マワロシカレ程オク近方ノ經驗  
凡限キ集ラ此書ノ後編トモヲボモク仕ラキタリラ板トエルベケレハ其ツイテ  
直スベキハ直ニテニ誤字トラモ心有コ人ハ推量ト知ベキワサナレト思ヘリ  
程ト誤字ヲアラクトテ子第ノ書板見セテハ其懇志モ捨ガタク直ニカクモ  
ノシテ集後ノ末ニヤタリト云ルハ又ハ下ニ不悉ニ書ヘリ○生積堂



夫年物若先主古之世居出處  
家無極致之親子嗣之甚患之而  
由來之世理遂三世而止出處  
之妙何待具之乎及若此世乃  
歎曰益出之妙後何以加之乎  
今世則原成之妙少矣命物美德

可急哉之爲之何因以生  
此字之形一云書之何云

門人下總 大川唐之亮跋



QV K477 v 1803

木島藏屋

七反下

